

قرص استرادیول والرات

قرص خط دار ۲۰۱ میلی گرم

مشخصات دارو:

قرص های استرادیول والرات حاوی ۱ یا ۲ میلی گرم ماده ی موثره ی استرادیول والرات می باشند. قرص های استرادیول والرات حاوی هورمون زنانه ی استروژن می باشند و در درمان جایگزینی هورمونی مورد مصرف قرار می گیرند.

موارد مصرف دارو:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه ی آن به دیگران جدا خودداری نمایید. در دوران یانسنگی به دلیل کاهش سطح استروژن در بدن علائمی مانند گرگرفتگی و تعریق شبانه ایجاد می شود. استرادیول والرات می تواند باعث بهبود این علائم شود. هم چنین به دلیل افزایش ریسک شکستگی بر اثر پوکی استخوان بعد از یانسنگی، استرادیول والرات می تواند باعث پیش گیری از پوکی استخوان شود.

موارد منع مصرف:

در صورت وجود شرایط زیر قبل از شروع دارو با پزشک خود مشورت نمایید:

- سرطان پستان یا سابقه ی ابتلا به آن
- هرگونه سرطان وابسته به استروژن ها (مانند سرطان اندومتر رحم)
- هرگونه خونریزی غیرمعمول واژینال
- افزایش ضخامت دیواره ی رحم (هایپرپلازی اندومتر)
- سابقه ی تشکیل لخته، وجود مشکلات انعقادی خون، سابقه ی سکتة ی قلبی یا مغزی
- بیماری کبدی
- هرگونه حساسیت نسبت به ماده ی موثره ی دارو

هشدارها و احتیاطات:

قبل از مصرف این دارو در مورد مشکلات ذیل با پزشک خود مشورت نمایید:

- وجود بافت فیبروم در رحم
 - رشد بافت دیواره ی رحم خارج از آن (اندومتریوز)
 - افزایش ریسک تشکیل لخته
 - سابقه سرطان وابسته به استروژن در خانواده
 - بالا بودن فشار خون، دیابت، سنگ های صفراوی، سردرد های شدید یا میگرن
 - وجود بیماری خود ایمنی لوپوس
 - بالا بودن چربی خون
 - احتیاس مایعات به دلیل بیماری قلبی/کلیوی
- در صورت مشاهده ی علائم زیر دارو را سریعاً قطع نمایید:
- افزایش فشار خون، زرد شدن صلبیه ی چشم یا پوست
- علائم تشکیل لخته ی خون مانند: درد ناگهانی در سینه، التهاب دردناک و قرمزی در پا، مشکل در تنفس

نکته:

قرص استرادیول والرات قرص ضد بارداری نمی باشد. برای پیشگیری از بارداری از روش های لازم استفاده نمایید.

بارداری و شیردهی:

قرص استرادیول والرات تنها برای استفاده در خانم ها در شرایط یانسنگی است. اگر باردار یا شیرده هستید از مصرف این دارو خودداری نمایید. در صورت باردار شدن دارو را سریعاً قطع نمایید و پزشک خود را آگاه سازید.

تداخلات دارویی:

در صورت مصرف هر گونه داروی دیگر پزشک خود را آگاه سازید. بعضی دارو ها می توانند با قرص استرادیول والرات تداخل پیدا کنند که می توانند باعث خونریزی های نامنظم یا افزایش اثر استرادیول شوند. این تداخلات شامل داروهای ذیل می باشد:

- داروهای ضد تشنج (مانند باربیتورات ها، فنی توئین، پریمیدون، کاربامازپین)
- داروهای ضد سل (مانند ریفامپین)
- داروهای ضد هیپاتیت C (نویراپین، افویرنیز، ریتوناویر و نلفیناویر)
- داروهای ضد قارچ (فلوکونازول، ایترکانازول) و آنتی بیوتیک ها (کلاریترومایسین و اریترومیسین)
- وراپامیل و دیلتیازم در درمان بیماری های قلبی

نحوه ی تجویز دارو:

دارو را طبق تجویز پزشک مصرف نمایید. دوز پیشنهادی ۲ میلی گرم در روز می باشد. این دوز توسط پزشک شما می تواند افزایش یا کاهش یابد. دارو را هر روز در یک زمان مشخص به همراه غذا مصرف نمایید. مصرف قرصی استرادیول والرات در کودکان و نوجوانان تایید نشده است.

نحوه ی شروع دارو:

• در صورتی که داروی دیگری برای درمان جایگزینی هورمونی دریافت می کنید: استرادیول والرات را روز بعد از اتمام داروی قبلی شروع نمایید.

- اگر برای اولین بار تحت درمان جایگزینی هورمونی هستید، و همچنان قاعدگی منظم دارید: قرص استرادیول را در روز اول خونریزی شروع نمایید.
- اگر برای اولین بار تحت درمان جایگزینی هورمونی هستید، و قاعدگی منظم ندارد: قرص استرادیول را می توانید در هر زمان شروع نمایید (در صورت عدم بارداری)

– دوز بالای استرادیول می تواند باعث تهوع، استفراغ و قاعدگی نامنظم شود. در صورتی که بیش از دوز مصرفی دارو مصرف کرده اید، پزشک خود را آگاه سازید.

در صورت فراموش کردن دوز مصرفی:

اگر کمتر از ۱۲ ساعت از زمان مصرف دارو گذشته باشد، قرص را هر چه سریعتر مصرف نمایید. اگر بیش از ۱۲ ساعت از زمان مصرف دارو گذشته باشد، دارو را مصرف ننمایید. باقی قرص ها را طبق روال مصرف نمایید. در این صورت امکان خونریزی و لکه بینی وجود دارد. در صورت قطع درمان با استرادیول والرات، ممکن است علائم یانسنگی مانند گرگرفتگی، اختلال در خواب، خشکی واژینال را دوباره تجربه کنید. در صورت عدم تمایل به ادامه ی درمان با پزشک خود مشورت نمایید.

عوارض جانبی:

مانند همه ی دارو های دیگر، استرادیول والرات می تواند عوارض ناخواسته ای به دنبال داشته باشد، گرچه همه ی مصرف کنندگان این دارو این عوارض را تجربه نمی کنند. بیماری های ذیل در خانم هایی که درمان جایگزینی هورمونی می شوند نسبت به خانم هایی که تحت این نوع درمان نیستند، بیش تر گزارش شده است:

- سرطان پستان
- سرطان دیواره ی رحم یا اندومتریوز
- تشکیل لخته های خونی در پا یا ریه
- بیماری های قلبی
- زوال عقل در صورتی که شروع درمان از سن ۶۵ سال به بالا باشد
- عوارض جانبی که در ارتباط با مصرف استرادیول والرات و سایر درمان های جایگزینی هورمونی گزارش شده است:
- در چندین ماه اول درمان امکان خونریزی واژینال غیر منظمه وجود دارد. این علائم معمولاً با ادامه درمان کمتر می شوند. در صورت ادامه ی خونریزی پزشک خود را مطلع سازید.
- حساس و بزرگ شدن سینه ها و خروج ترشحات از پستان
- قاعدگی دردناک، تغییر در ترشحات واژن، تغییر سایز فیبروم در رحم، تغییرات در گردنه ی رحم
- سوز، هاضمه، درد شکم، نفخ، بیماری های کیسه ی صفرا
- راش جلدی، خارش، جوش، افزایش رنگ پوست
- سردرد، میگرن، خستگی
- افزایش فشار خون، تپش قلب، التهاب وریدها به خصوص در پا
- احتیاس مایعات و ادم، تغییر در وزن و میل جنسی، افزایش اشتها

شرایط نگهداری دارو:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و در بسته بندی اصلی نگهداری نمایید. دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

98 MM

ساخت شرکت داروسازی **ایورجان** (سهامی عام)



220 MM