



شیاف لاکسادیل® ۵ و ۱۰ میلی گرم بیزاکودیل

دسته دارویی:
ملین (تحریک کننده تماسی)

نحوه عمل و فارماکوکینتیک:

بیزاکودیل یک ملین تحریک کننده تماسی است که بصورت شیاف مستقیماً بر روی مخاط روده ی بزرگ اثر گذاشته و حرکات دودی شکلی در سرتاسر روده ی بزرگ ایجاد می کند، جذب دارو بسیار ضعیف و قابل اغماض می باشد. بیزاکودیل در تماس با مخاط یا انشعابات تحت مخاطی روده بزرگ، انتها های عصبی حسی را تحریک نموده و ایجاد رفلکس های پاراسمپاتیک می نماید و در نتیجه انقباضات پرستالتیک را افزایش می دهد. این دارو همچنین موجب افزایش تجمع آب و املاح در روده بزرگ گشته و باعث افزایش اثر ملین می گردد. اثر دارو (حرکات روده) معمولاً ۱۵ دقیقه تا یک ساعت پس از استعمال شیاف بروز می نماید.

موارد مصرف:

جهت برطرف ساختن یبوست غیر دائم و بی نظمی دفع (درمان کوتاه مدت)
- پاک نمودن روده در آماده سازی برای عمل جراحی یا آماده سازی مریض برای آزمایشات آندوسکوپی.
- بیزاکودیل را نمی توان بعنوان جایگزین شستشو دهنده های معمول قبل از جراحی بکار برد و صرفاً بعنوان تخلیه کننده اولیه روده بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد.
- بیزاکودیل را همچنین نمی توان جهت مراقبت های پس از عمل جراحی، قبل از زایمان، پس از زایمان و جهت آماده سازی برای زایمان بکار برد.

موارد منع مصرف:

- آپاندیسیت یا علائم آن (مانند حالات تهوع، استفراغ و غیره)
- خونریزی مقعدی بدون تشخیص معین
- نارسایی قلبی
- انسداد روده
- حساسیت به خود دارو

هشدارها و موارد احتیاط:

- مصرف لاکسادیل® در ناراحتی هایی مانند درد ناحیه شکم، تهوع با استفراغ توصیه نمی شود.
- تجویز طولانی مدت این دارو جهت درمان یبوست مزمن، توصیه نمی شود.
- مدت مصرف لاکسادیل® نباید از ۷ روز تجاوز کند، مگر اینکه توسط پزشک لازم تشخیص داده شود.
- خونریزی مقعدی یا عدم ایجاد حرکت روده پس از مصرف لاکسادیل® ممکن است نشان دهنده یک وضعیت جدی باشد، در صورت بروز این حالت مصرف دارو باید متوقف شود.
- در افراد مسن ممکن است مصرف مکرر لاکسادیل® جهت تخلیه روده باعث از دست دادن مقادیر زیادی آب و املاح (الکترولیت) شده و باعث تشدید حالات ضعف، ناهماهنگی حرکات و افت فشار اورتو استاتیک گردد.

عوارض جانبی (ناخواسته):

- در فرآیند باز یابی فعالیت طبیعی روده با استفاده از لاکسادیل®، ممکن است برخی ناراحتی های ناحیه شکم (مانند درد، نفخ و غیره) ایجاد گردد.
- شیاف لاکسادیل® ممکن است باعث ایجاد پروکتیت و التهاب گردد، به همین دلیل مصرف طولانی این دارو توصیه نمی گردد.

مقدار مصرف دارو: (دوره ۲۸ روزه)

بزرگسالان: ۱۰ میلی گرم یکبار در روز، جهت ایجاد حرکات روده.
کودکان (۶ تا ۱۲ سال): ۵ میلی گرم یک بار در روز.

بسته بندی:

۱۰ عدد شیاف لاکسادیل® در استریپ آلومینیومی در یک جعبه. هر شیاف دارای ۵ میلی گرم بیزاکودیل (برای کودکان) یا ۱۰ میلی گرم بیزاکودیل (برای بزرگسالان) می باشد.

شرایط نگهداری:

- دارو را در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد و درون جعبه نگهداری نمایید.
- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

مصرف کننده محترم، از انتخاب و اعتماد شما سپاسگزاریم. شرکت داروسازی ایوریجان افتخار دارد به اطلاع برساند، بخش علمی شرکت با شماره ۷۷۷۱۵۵۵۴ از ساعت ۸ صبح الی ۴ بعدازظهر، پاسخگوی سوالات علمی شما عزیزان است.

ساخت شرکت داروسازی ایوریجان (سهامی عام)