

آمپول فوروزماید

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است ، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری فرمائید.

مشخصات دارو :

آمپول فوروزماید حاوی ۱۰ میلی گرم فوروزماید در هر یک میلی لیتر می باشد .

مصرف در دوران بارداری و شیردهی :

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی شود مگر به تشخیص پزشک متخصص .

موارد منع مصرف :

وجود هر نوع حساسیت به دارو یا داروهای سولفونیل اوره
بیماران با سابقه اسهال آبکی و شدید در موارد مصرف قبلی، آنوریا

هشدارها :

۱. مصرف این دارو ممکن است منجر به از دست رفتن آب بدن و کاهش در حجم خون به ویژه در سالمندان گردد .
۲. وزوز گوش و اختلالات در شنوایی و سرگیجه در مصرف این دارو گزارش شده است که در طی ۱ الی ۲۴ ساعت بر می گردد . تزریق سریع دارو و تزریق دوزهای بالای دارو، نارسایی کلیوی شدید، مصرف همزمان با داروهای اتوتوکسیک یا امینوگلیکوزیدها ممکن است اتوتوکسیسیته را افزایش دهد .
۳. ممکن است با مصرف این دارو لوپوس اریتماتوز تشدید یا فعال شود .
۴. امکان ایجاد اسهال آبکی در مصرف این دارو وجود دارد .
۵. عدم تعادل الکترولیت ها : در بیماران دریافت کننده دوز بالا عدم تعادل الکترولیت ها ممکن است اتفاق بیفتد .
۶. هیپوکالمی
پیشگیری از هیپوکالمی به خصوص در موارد ذیل ضروری می باشد:
بیماران با نارسایی احتقانی قلب که مصرف کننده داروهای دیجیتال و دیورتیک می باشند ، سیروز کبدی و اسیت ، موارد افزایش آلدوسترون با عملکرد کلیوی نرمال ، نفروپاتی
۷. هیپوپروتئینمی :
در این بیماران اثر فوروزماید تشدید و عوارض اتوتوکسیسیته افزایش می یابد .
۸. هیپومیزمی و هیپوکسمی : در این بیماران منیزیم و کلسیم خون ممکن است کاهش پیدا کند .
۹. هیپوآوریسمی :
BUN و کراتینین سرم ممکن است افزایش پیدا کند .
۱۰. افزایش در گلوکز خون و کلسترول و تری گلیسرید ممکن است ایجاد شود .
۱۱. احتیاس ادراری ممکن است ایجاد شود .
۱۲. نفروپاتی ناشی از داروهای رادیوکانتراست در بیمارانی که فوروزماید مصرف می کنند بیشتر می باشد .
۱۳. در بیماران با نارسایی عملکرد کبدی و کلیوی با احتیاط مصرف شود .
۱۴. ممکن است منجر به افزایش حساسیت به نور شود . محافظت از نور خورشید یا نور UV توصیه می شود

مقدار و نحوه مصرف دارو:

دارو را طبق دستور پزشک مصرف نمایید .
در صورت مشاهده تغییر رنگ و یا وجود ذرات از مصرف فرآورده خودداری نمایید .
فرآورده برای یک یا مصرف است . باقیمانده دارو دور ریخته شود .
به صورت تزریق آهسته وریدی طی مدت یک الی دو دقیقه یا عضلانی مصرف شود .
در صورت نیاز به درمان با دوز بالا ، به صورت انفوزیون وریدی با سرعت ۴ میلی گرم در دقیقه و یا کمتر اقدام شود .
داروهای اسیدی مانند لاپتالول ، سیپروفلوکساسین ، میلیتون ، امریتون نباید با فوروزماید در یک محلول انفوزیون مخلوط شوند .

عوارض جانبی :

قلبی- عروقی: کاهش حجم خون و دهیدراسیون، افت فشار وضعیتی، ترومبوفلیت با تزریق وریدی

پوست: درماتیت، پورپورا، درد گذرا در محل تزریق عضلانی

دستگاه گوارش: درد و ناراحتی شکمی، بی اشتهایی ، بیوست، اسهال، تهوع، پانکراتیت، استفراغ

خون: آکرنولوسیتوز، لکوپنی، ترومبوسیتوپنی، آنمی، آنمی آپلاستیک

متابولیک: آکالوز ناشی از کمی کلر خون، هایپرآوریسمی بی علامت، عدم تعادل الکترولیت ها و مایعات، از جمله کاهش کلسیم، منیزیم، و سدیم خون ناشی از رقیق شدن خون، افزایش قند خون، عدم تحمل گلوکز، هایپوکالمی

گوش، حلق، بینی، چشم: تاری دید، کاهش گذرای شنوایی با تزریق وریدی بسیار سریع

اعصاب مرکزی: گیجی، تب ، سردرد، بی قراری، سرگیجه

ادراری: ازوتمی، تکر ادرار، اولیگوری، پلی اوری، نارسایی کلیه

عضلانی-اسکلتی: اسپاسم عضلانی ، ضعف

تداخلات دارویی :

مصرف همزمان با امینوگلیکوزیدها، عوارض گوشه ناشی از فوروزماید را افزایش می دهد.
فوروزماید اثر اکثر داروهای گاهنده فشار خون را تشدید می کند .
فوروزماید ممکن است اثر هیپوگلیسمی ناشی از داروهای ضد دیابت را کاهش دهد. سطح گلوکز خون بیمار باید مانیتور شود.
در استفاده همزمان با گلیکوزیدهای قلبی ، لیتیم، بلوک کننده های عصبی - عضلانی، خطر سمیت با این داروها افزایش می یابد. سطح پتاسیم خون مانیتور شود.
داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی می توانند پاسخ دیورتیکی را مهار کنند. در صورت مصرف همزمان، احتیاط شود.
قرار گرفتن در معرض نور خورشید می تواند واکنشهای حساسیت به نور را تشدید کند. بنابراین احتیاط شود

مسمومیت :

با توجه به اینکه فوروزماید یک دیورتیک قوی می باشد ، در صورت مصرف بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک و یا مشاهده عوارض به شکل شدید و یا حالت کما، درمان متوقف و هرچه سریعتر مسموم را به بیمارستان برسانید.

شرایط نگهداری :

دارو را دور از نور و داخل جعبه و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید .
دارو را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

ساخت شرکت داروسازی **ابوریحان** تهران-ایران

