

پماد جلدی هیدروکورتیزون ۱٪

مشخصات دارو:

هر جعبه حاوی یک عدد تیوب ۱۵ گرمی پماد هیدروکورتیزون می باشد که در هر ۱۰۰ گرم پماد، یک گرم هیدروکورتیزون استات وجود دارد .

موارد مصرف دارو :

ضد التهاب موضعی (کورتیکواستروئید)

راهنمایی عمومی برای مصرف صحیح دارو :

• هیدروکورتیزون یک داروی ضد التهاب از دسته کورتیکواستروئیدها است که در کاهش التهاب بیماری هایی نظیر درماتیت تماسی، اگزما، آفتاب سوختگی و سوختگی درجه یک و دو ، همچنین بعنوان داروی کمکی در درمان بیماریهای همراه التهاب نظیر درماتیت شدید محل پوشک در نوزادان بکار میرود .
• قبل از مصرف دارو در صورت سابقه حساسیت به این دارو یا سایر کورتیکواستروئیدها ، عفونت بخصوص عفونت های اولیه باکتریائی، بارداری یا شیردهی با پزشک خود مشورت کنید .

مقدار و نحوه مصرف دارو :

• از آنجایی که میزان جذب دارو از پوست به پایه مورد استفاده، مدت زمان تماس دارو با پوست ، سطح تماس دارو با پوست و وضعیت پوست بستگی دارد، مقدار مصرف دارو برای بیمار را پزشک تعیین می کند ولی میزان متعارف استعمال یک لایه نازک، دو یا سه بار در روز بسته به شدت ضایعه پوستی می باشد.

• در درمان پسوریازیس یا مشکلات پوستی وخیم ممکن است پزشک، پانسمان را توصیه کند.

• در صورتی که یک نوبت استفاده از دارو را فراموش نمودید به محض یادآوری استفاده کنید اما اگر نوبت بعدی فرارسیده است از دو برابر نمودن دوز دارو خودداری نمایید .

موارد منع مصرف :

• در صورت سابقه حساسیت به این دارو و سایر کورتیکواستروئیدها .

موارد احتیاط و هشدارها :

• این دارو تنها برای مصرف خارجی می باشد، از تماس با چشم خودداری کنید.
• طبق دستور پزشک مصرف نمایید و از پانسمان خود سرانه ضایعه خودداری کنید (مگر به تشخیص پزشک).
• پانسمان جذب دارو را خصوصا در کودکان افزایش می دهد.
• این دارو نباید در دوران بارداری در منطقه وسیعی از بدن یا در زمان طولانی مصرف شود.
• مصرف این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی شود مگر به تشخیص پزشک متخصص.

• در کودکان حتی الامکان کمترین دوز استروئید استفاده شود. مصرف طولانی مدت این دارو می تواند موجب تاخیر در رشد ونمو کودکان شود.
• در موارد وجود عفونت از استروئیدها بهمراه آنتی بیوتیک و یا داروهای ضد قارچ استفاده کنید .که اگر نتیجه درمان رضایت بخش نباشد، مصرف استروئید را تا زمان درمان عفونت باید قطع نمود .
• در صورت ایجاد عفونت به دنبال استفاده از پانسمان، مصرف دارو متوقف شود و آنتی بیوتیک مناسب طبق مشورت با پزشک مصرف شود .

عوارض جانبی:

عوارض زیر اغلب با اشکال موضعی هیدروکورتیزون ایجاد می شود، که در صورت پانسمان احتمال وقوع این عوارض بیشتر می شود:

سوزش

خارش

تحریک

خشکی

تشدید آکنه

درماتیت تماسی

شرایط نگهداری دارو :

دارو را داخل جعبه و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید .

از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید .

دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید .

پس از هر بار مصرف درب تیوب را محکم ببندید.

ساخت شرکت داروسازی **ابوریحان** (سهامی عام)

