



لیکادین - پی®

کرم موضعی (لیدوکائین ۲/۵ درصد / پریلوکائین ۲/۵ درصد)

دسته دارویی:

بی حس کننده موضعی

موارد مصرف:

- ایجاد بی حسی موضعی در پوست سالم
- غشاء مخاطی دستگاه تناسلی زنانه برای جراحی های سطحی و درمان قبل از ایجاد بی حسی انفیلتراسیون

موارد منع مصرف:

حساسیت به دارو، اختلال خونی مت هموگلوبینمی، نوزادان با سن گوارشی کمتر از ۳۷ هفته، نوزادان در سن کمتر از ۱۲ ماه دریافت کننده عوامل کاهنده مت هموگلوبین. نکته: از تماس این دارو با گوش (به خصوص گوش میانی) جلوگیری شود.

عوارض جانبی:

- واکنش های آلرژیک و آنافیلاکتیک مانند کهیر، آنژیوادم، برونکواسپاسم و شوک
- واکنش های سیستمیک وابسته به دوز مانند تحریک سیستم اعصاب مرکزی، دپرسیون، سردرد، عصبانیت، اضطراب، سرخوشی، گیجی، سرگیجه، منگی، وزوز گوش، اختلالات بینایی، تهوع، احساس گرما، سرما و مورمور شدن، انقباض عضلات، لرزش، تشنج، عدم هشیاری، دپرسیون و یا توقف تنفس
- حساسیت غیرطبیعی پوست مانند احساس سوزش، تغییر در احساس سرما و گرما، رنگ پریدگی، قرمزی، تورم، واکنش های آلرژیک شدید مانند راش، کهیر، خارش، اشکال در تنفس، سختی قفسه سینه، تورم دهان، لب ها، صورت و زبان

موارد احتیاط:

استفاده از دارو در سطوح وسیع و برای مدت زمان طولانی، تأثیر اوتوتوکسیک (سمیت گوش) در صورت تماس دارو با گوش میانی، لزوم بررسی میزان جذب دارو در مصرف هم زمان این دارو با سایر داروهای بی حس کننده موضعی به منظور کنترل عوارض

مقدار مصرف دارو:

بزرگسالان:

- بی حس کردن پوست سالم: قرار دادن یک لایه ضخیم از دارو روی پوست و پانسمان آن
- غشاء موکوسی ژنیتال: قرار دادن یک لایه ضخیم (۵ تا ۱۰ گرم) از دارو در موضع برای مدت ۱۰-۵ دقیقه.

کودکان:

سن و وزن	دوز ماکزیمم	حداکثر سطح مصرف دارو	حداکثر زمان تماس دارو
تا سن ۳ ماه یا وزن کمتر از ۵ کیلوگرم	۱ گرم	۱۰ سانتی مترمربع	۱ ساعت
سن ۳-۱۲ ماه یا وزن ۵-۱۰ کیلوگرم	۲ گرم	۲۰ سانتی مترمربع	۴ ساعت
سن ۱-۶ سال یا وزن ۱۰-۲۰ کیلوگرم	۱۰ گرم	۱۰۰ سانتی مترمربع	۴ ساعت
سن ۷-۱۲ سال یا وزن بالاتر از ۲۰ کیلوگرم	۲۰ گرم	۲۰۰ سانتی مترمربع	۴ ساعت

تداخل های دارویی:

در مصرف هم زمان با:

داروهای آنتی آریتمی مانند آمیودارون، دوفتیلید، مگزیلتین و توکایناید، بتابلاکرها، سایر داروهای بی حس کننده موضعی، استامینوفن، استانیلید، بنزوکائین، کلروکین، داپسون، نفتالن، نیترات ها، نیتريت ها، نیتروفورانتوئین، نیتروپروساید، پاماکین، پارامینو سالیسیلیک اسید، فنانستین، فنوباربیتال، فنی توفین، پریماکین، کینین، سولفونامیدها، سوکسینیل کولین.

مصرف در بارداری و شیردهی:

رده بارداری B، مطالعات کافی و کنترل شده در مورد اثر این دارو در دوران بارداری و شیردهی صورت نگرفته است.

شرایط نگهداری، اشکال دارویی و نوع بسته بندی:

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰°C، نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.
- پس از هر بار مصرف دارو، در تیوب را محکم ببندید.
- هر جعبه کرم موضعی لیکادین- پی® حاوی یک تیوب ۳۰ گرمی می باشد.

مصرف کننده محترم، از انتخاب و اعتماد شما سپاسگزاریم. شرکت داروسازی ابوریحان افتخار دارد به اطلاع برساند، بخش علمی شرکت با شماره تلفن ۷۷۷۱۵۵۵۴ از ساعت ۸ صبح الی ۴ بعد از ظهر، پاسخگوی سؤالات علمی شما عزیزان است.

ساخت شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)