

## برندوکر® قرص های ۲۰ و ۴۰ میلی گرمی

### دسته دارویی

ضد آنورکسی، ضد کاشکسی، ضد نئوپلاسم

### موارد مصرف

- درمان کاشکسی
- درمان آنورکسی
- درمان کاهش وزن (معمولا همراه سرطان)
- درمان کارسینومای سینه
- درمان کارسینومای اندومتريوم
- درمان کارسینومای پروستات
- پیشگیری از بروز هیپرپلازی اندومتريوم ناشی از استروژن

### موارد منع مصرف

حساسیت به بادام زمینی، بدخیمی یا تومور سینه، بیماری های حاد کبد مانند تومور بدخیم کبد، ازدیاد حساسیت به پروژستین ها، بارداری، ترومبوفلبیت فعال یا ترومبوآمبولیک، خونریزی (بدون تشخیص) مجاری ادرار، رحم یا سایر ارگان های تناسلی

**لزوم برآورد فواید و مضرات تجویز دارو در موارد زیر:**

آسم، نارسایی عملکرد قلب، صرع، هیپرتانسیون، سردردهای میگرنی، نقصان عملکرد کلیه، سابقه ابتلا به اختلالات سیستم اعصاب مرکزی مانند افسردگی و تشنج، دیابت ملیتوس، سابقه ابتلا به بیماری های کبدی یا نقصان عملکرد کبد، هیپرلیپیدمی، احتمال ابتلا به کمبود مواد معدنی در استخوان ها، سابقه ابتلا به بیماری ترومبوآمبولیک شامل بیماری عروق مغزی، آمبولی ریه، ترومبوز شبکیه و سابقه ابتلا به ترومبوفلبیت

### عوارض جانی

عوارض نیازمند به توجهات پزشکی:

آمنوره، خونریزی های قاعدگی منقطع یا مترومنوراژی، هیپرگلیسمی، لکه بینی، گالاکتوره، افسردگی، راش پوستی، سرکوب یا عدم کفایت عملکرد فوق کلیه یا بروز افت فشار خون، سندروم کوشینگ، ترومبوآمبولیسم یا شکل گیری ترومبوز عوارض نیازمند به توجهات پزشکی در صورت ادامه یافتن یا بدتر شدن:

کرامپ یا درد شکم، اسهال، سرگیجه، خواب آلودگی، ادم، احساس خستگی، سردرد، تغییرات رفتاری، تهوع، عصبانیت، بزرگ شدن تخمدان ها یا تشکیل کیست تخمدان، ضعف، افزایش سریع و غیرمعمول وزن، استفراغ، آکنه، ایجاد درد و سفتی در سینه، گرگرفتگی، بیخوابی، کاهش میل جنسی، کاهش یا افزایش رویش موی بدن، سر و صورت، ملاسما عوارض نیازمند به توجهات پزشکی در صورت بروز آنها بعد از قطع درمان:

سرکوب یا عدم کفایت عملکرد فوق کلیه یا بروز افت فشار خون، تاخیر بازگشت زنان به باروری

### مقدار مصرف دارو بزرگسالان:

- آنورکسی، کاشکسی یا کاهش وزن در بیمار مبتلا به سرطان: روزانه ۸۰۰-۴۰۰ میلی گرم در یک دوز
- کارسینومای سینه: روزانه ۱۶۰ میلی گرم در یک دوز یا دوزهای منقسم
- کارسینومای اندومتريوم: روزانه ۳۲۰-۴۰ میلی گرم در دوزهای منقسم
- کارسینومای پیشرفته پروستات: روزانه ۱۲۰ میلی گرم در یک دوز همراه ۱/۰ میلی گرم دی اتیل استیل بسترول
- هیپرپلازی اندومتريال: روزانه ۴۰-۲۰ میلی گرم به مدت ۱۴ روز یا بیشتر از هر ماه

### کودکان:

دوز دارو در این گروه سنی ثابت نگردیده است.

### تداخل های دارویی

در مصرف همزمان با :  
داروهای القا کننده آنزیم های کبدی مانند  
کاربامازپین، فنوباربیتال، فنی توئین، ریفابوتین یا  
ریفامپین

**مصرف در حاملگی و شیردهی:**  
رده بارداری D، این دارو نباید در دوران  
بارداری و همچنین شیردهی تجویز گردد.

**شرایط نگهداری، اشکال دارویی و نوع بسته بندی:**  
دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد  
نگهداری و از نور و رطوبت محافظت نمایید.  
هر ۱۰ عدد قرص ۲۰ یا ۴۰ میلی گرمی برندوکر® یک  
بلیستر و هر ۳ بلیستر همراه یک برگه راهنما در یک  
جعبه مقوایی قرار دارد.

**ساخت شرکت داروسازی ابوریحان، تهران-ایران**

منابع

USPDI 2010