

شیاف فرتیژست®

شکل دارویی:

شیاف فرتیژست® حاوی پروژسترون و به صورت 200 و 400 میلی گرمی توسط داروسازی ابوریحان ارائه می گردد.

دسته دارویی: پروژستین

مکانیسم عمل:

مهار تخمک گذاری، افزایش ویسکوزیته مخاط سرویکس، افزایش پذیرش اندومتر

موارد مصرف:

- آمنوره
- خونریزی واژینال
- سندرم پیش از قاعدگی
- نگهداری بارداری در زمان کاشت
- افزایش سطح پروژسترون در مواردی که درمان ناباروری موجب کاهش پروژسترون شده باشد

مقدار مصرف:

200 میلی گرم روزانه تا حداکثر 400 میلی گرم دو بار در روز

نکته:


شیاف فرتیژست® قابلیت استفاده به صورت رکتال و واژینال را دارد.

در موارد زیر استفاده واژینال ارجح است:

- التهاب کولون
- اشکال در کنترل حرکات روده
- در موارد زیر بهتر است رکتال استفاده شود:
- پس از زایمان
- سوزش و التهاب و یا عفونت واژینال
- استفاده از برخی روش های ضد بارداری مانند:کاندوم، کپ و دیافراگم

مقایسه با سیکلوژست:

- در یک طرح تحقیقاتی شیاف فرتیژست® ابوریحان با شیاف سیکلوژست در حمایت از فاز لوتئال بیماران تحت درمان سیکلهای IUI در پژوهشکده رویان مقایسه شد. این مطالعه به طور تصادفی روی 200 خانم که متوسط نازایی آنها 5.53 ± 3.41 سال بود، انجام شد و در کل نتایج بارداری در میزان حاملگی شیمیایی و بالینی اختلاف معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد.
- در مطالعه دیگری حلالیت و آزادسازی شیاف فرتیژست® داروسازی ابوریحان با شیاف cyclogest® شرکت ALpharma بعنوان نمونه معتبر مرجع، مقایسه ای انجام شد. مطالعات بالینی آن در مرکز ناباروری اصفهان انجام شد و نتیجه به تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسید. نتیجه بیانگر آزادسازی و dissolution profile یکسان بود.



عوارض:

سرگیجه، سردرد، خستگی، افسردگی، راش، آلورژی، آکنه، آمنوره، دیس منوره، آمبولی ریه، یرقان کلستاتیک، هایپرگلیسمی

منع مصرف:

حساسیت به پروژستین ها و سایر اجزای تشکیل دهنده دارو، اختلال کلیه و کبد، سرطان پستان، خونریزی بدون تشخیص، بارداری و شیردهی، دیابت، میگرن، افسردگی، بیماریهای قلبی، تشنج

تداخلات:

بروموکریپتین، کاربامازپین، فنی توئین، فنوباربیتال، گریزوفلووین، ریفامپین

احتیاط:

چنانچه هر یک از موارد زیر را مشاهده کردید به پزشک خود اطلاع دهید:
خونریزی واژینال، توده پستان، درد قفسه سینه، بی حسی یا سفتی عضلات، ادم، یرقان، ادرار تیره، مدفوع کمرنگ، سردرد، تاری دید، تنگی نفس

اطلاعات بیمار:

- دارو ممکن است موجب افزایش وزن بیمار گردد، وزن خود را روزانه کنترل کنید و چنانچه در هفته بیش از 2.5 کیلوگرم افزایش وزن داشتید به پزشک اطلاع دهید.
- در طول دوره مصرف فشار خون به طور مرتب کنترل و تستهای کبدی مانند AST و ALT و بیلی روبین کنترل شود.
- اگر دیابت دارید قند خون خود را مرتباً چک کنید.
- در صورت بروز تغییرات احساسی، عاطفی، ذهنی، خلق و خو پزشکتان را مطلع سازید.

بارداری و شیردهی:

این دارو در بارداری در گروه X قرار دارد و منع مصرف دارد.
به دلیل ترشح دارو در شیر مادر، در دوران شیردهی نباید استفاده شود.

نگهداری:

بهترین دمای نگهداری فرنیژست® 25c درجه است ولی میتوان آنرا در دمای 15c تا 30c هم نگه داشت.