

## (آلپرازولام)

**شكل دارویی:** قرص های ۰/۵ و ۱ میلی گرمی

**دسته دارویی:** بنزودیازپین کوتاه اثر

**موارد مصرف:** درمان کوتاه مدت اضطراب؛ درمان کمکی اضطراب همراه با دپرسیون؛ درمان بیخوابی؛

درمان اختلال پانیک؛ درمان لرزش

**مقدار مصرف معمول دارو**

**بزرگسالان**

**در درمان اضطراب:** دوز اوپیه، ۵۰۰-۲۵۰ میکرو گرم (۰/۵ میلی گرم)، سه بار در روز می باشد. این

دوز با توجه به نیاز بیمار، تا حد اکثر ۴ میلی گرم در روز قابل افزایش است. در صورت بروز عوارض جانبی، می توان درمان را با دوز های کمتری آغاز نمود.

**در درمان اختلال پانیک:** دوز اوپیه، ۵۰۰ میکرو گرم (۰/۵ میلی گرم)، سه بار در روز می باشد. این دوز با

توجه به نیاز و تحمل بیمار، تا حد اکثر ۱۰ میلی گرم در روز قابل افزایش است.

نکته: در افراد سالماند، مبتلایان به نارسایی عملکرد کبد یا کلیه و همچنین در کسانی که سطح آلبومین سرمه آنها پایین تر از حد نرمال می باشد، به منظور کنترل عملکرد دارو و کاهش عوارض جانبی، درمان با دوزهای کمتر شروع می شود.

**کودکان:** اثربخشی و بی خطر بودن این دارو در افراد زیر ۱۸ سال، اثبات نگردیده است.

**موارد منع مصرف:** مسمومیت با الکل همراه با سرکوب سیستم اعصاب مرکزی و علائم حیاتی، کوما و شوک، سابقه سوء مصرف دارو یا وابستگی به آن، سابقه صرع و تشنج، گلوکوم با زاویه بسته (یا استعداد نهفته ابتلا به این بیماری)، نقصان عملکرد کبد، هیپر کینزی، هیپو آلبومینمیا، افسردگی شدید، میاستنی گراویس، اختلالات مغزی، پورفیری، سایکوز، بیماری انسدادی ریه (شدید و مزمن)، نقصان عملکرد کلیه، حساسیت به بنزودیازپین ها، آپنه حین خواب و مشکل در بلع (در کودکان)

**عوارض جانبی:** فراموشی؛ اضطراب، گیجی؛ افسردگی؛ تپش قلب؛ اختلالات فکری؛ واکنش های آлерژیک؛

تغییرات خلقی؛ دیسکرازی خونی؛ عوارض اکستراپیرامیدال؛ اختلال عملکرد کبد؛ هیپوتانسیون؛ ضعف عضلات؛ آژیتاسیون؛ بیخوابی؛ تحریک پذیری؛ ترومبوز؛ تشنج

نکته حائز اهمیت: در پایان دوره درمان، مصرف دارو باید به صورت تدریجی - و نه یکباره - کاهش یافته و سپس قطع گردد.

در اینصورت احتمال بروز علائم ناشی از قطع دارو بخصوص در بیماران با سابقه تشنج، کاهش چشمگیری می یابد.

**تداخل های دارویی:**

در مصرف همزمان با: مهار کننده های ایزو آنزیم CYP3A؛ الکل؛ داروهای سرکوب کننده سیستم اعصاب

مرکزی؛ ضد درد های مخدر؛ آنتی اسیدها؛ داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای؛ کاربامازپین؛ سایمتیدین؛

داروهای ضد بارداری خوراکی محتوى استروژن؛ دیلتیازم؛ دی سولفیرام؛ اریتروومایسین؛ فلوكستین؛

فلووکسامین؛ ایتراکونازول؛ کتوکونازول؛ نفازودون؛ پروپوکسی芬؛ رانیتیدین؛ وراپامیل؛ کلوزاپین؛ مشتقات

فتانیل؛ داروهای کاهنده فشار خون؛ ایزوپیازید؛ لوودوپا؛ امپرازول؛ پروبنسید؛ ریفامپین؛ اسکپولامین؛

زیدوودین و آب گریپ فروت

**بارداری و شیردهی:** رده‌ی بارداری D: آپرازولام از جفت عبور می‌کند. تجویز این دارو در دوران بارداری توصیه نمی‌گردد. این دارو در شیر ترشح می‌شود و با توجه به سرعت کمتر روند متابولیسم در نوزادان نسبت به سایر گروه‌های سنی و متعاقب آن تجمع دارو، موجب بروز خواب آلودگی، مشکلات تغذیه‌ای و کاهش وزن در شیرخوار می‌گردد.

**نحوه بسته بندی:** هر ۱۰ عدد قرص ۵/۰ یا ۱ میلی گرمی سدالام<sup>®</sup> در یک بلیستر و هر ۱۰ بلیستر همراه یک برگه راهنمایی در یک جعبه مقوایی قرار دارد.

**نگهداری:** دارو، در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری شود و از نور و رطوبت محافظت گردد.

References: USPDI 2010