

آدوان®

والسارتان

شکل دارویی

قرص روکش دار

دسته دارویی

ضد فشار خون (آنتاگونیست غیر پپتیدی آنژیوتانسین II در بافت های همانند عضلات صاف عروق و غده فوق کلیه)

موارد مصرف

*درمان فشارخون (به تنهایی یا بصورت ترکیبی با سایر عوامل ضد فشار خون)

والسارتان در مواردی که استفاده از دیورتیک ها و یا بتابلاکرها فاقد اثر بخشی مطلوب می باشد یا موجب بروز عوارض جانبی غیر قابل تحمل می شود و یا در شرایطی که این داروها در بیمار منع مصرف دارند، تجویز می گردد.



*نارسایی قلبی

*متعاقب انفارکتوس قلبی (جهت کاهش مرگ قلبی-عروقی)

مزایا:

والسارتان در کاهش فشارخون (سیستولی و دیاستولی) در طی ۲۴ ساعت شبانه روز، بهتر از لوزارتان عمل می نماید. عوارض جانبی این دارو در مقایسه با سایر داروهای کاهنده فشار خون، کمتر و قابل تحمل تر می باشد. بعنوان مثال والسارتان فاقد عوارض جانبی متابولیک است و باعث ایجاد سرفه نیز نمی شود. افت شدید فشار خون متعاقب مصرف اولین دوز والسارتان و افزایش مجدد فشارخون در فاصله زمانی کوتاه پس از ترک آن مشاهده نگردیده است.

مقدار مصرف معمول دارو

بزرگسالان:

درمان فشار خون: ۸۰ میلی گرم، یک بار در روز (در

بیمارانی که دچار کاهش حجم پلاسما نمی باشند.) به منظور افزایش اثربخشی دارو ممکن است دوز آن تا ۱۶۰-۳۲۰ میلی گرم افزایش یابد یا یک دیورتیک اضافه شود.

نارسایی قلبی: ۴۰ میلی گرم، دو بار در روز که بنا بر

میزان تحمل بیمار حداکثر تا ۱۶۰-۳۲۰ میلی گرم، دو بار در روز قابل افزایش است.

یس از انفارکتوس قلبی: والسارتان در طی ۱۲ ساعت اول پس از رخ دادن انفارکتوس تجویز می گردد. میزان مصرف در ابتدا ۲۰ میلی گرم، دو بار در روز است که به فاصله یک هفته به ۴۰ میلی گرم، دو بار در روز افزایش می یابد. در صورت تحمل بیمار، این میزان تا ۱۶۰ میلی گرم، دو بار در روز، قابل افزایش است.

کودکان:

اثر بخشی و بی خطر بودن این دارو در کودکان به اثبات نرسیده است.

تداخل های دارویی

در مصرف همزمان با:

- ✕ دیورتیک ها: تشدید اثر کاهندگی فشار خون والسارتان
- ✕ نمک های لیتیوم: کاهش کلیرانس لیتیوم
- ✕ داروهای حاوی پتاسیم: افزایش سطح پتاسیم سرم
- ✕ وارفارین: افزایش زمان انعقاد

عوارض جانبی

▲ عوارض نیازمند به توجهات پزشکی:

آنژیوادم و افت فشارخون

▲ عوارض نیازمند به توجهات پزشکی در صورت ادامه یافتن یا بدتر شدن

درد شکم، مفاصل یا پشت؛ فارنژیت؛ یبوست؛ اسهال؛ خشکی دهان؛ سرگیجه؛ خستگی؛ سردرد؛ عفونت دستگاه تنفسی فوقانی؛ عفونت های ویروسی؛ طپش قلب؛ راش پوستی؛ هیپرکالمی؛ اضطراب؛ بی خوابی؛ تنگی نفس؛ آلوپسی و ورتیگو

موارد منع مصرف

- ۱- حساسیت به والسارتان
- ۲- دهیدراتاسیون متعاقب تعرق شدید، استفراغ، اسهال، درمان طولانی مدت با دیورتیک ها، دیالیز و مصرف رژیم کم نمک
- ۳- نقص عملکرد کبد یا کلیه

بارداری و شیردهی



«رده بارداری C در سه ماهه اول و D در سه ماهه دوم و سوم»

داروهایی که مستقیماً " بر سیستم رنین-آنژیوتانسین موثرند می توانند موجب بروز مرگ جنین گردند، بنابراین مصرف والسارتان باید به محض تشخیص بارداری قطع شود، حتی اگر درمان دیگری جایگزین نشود.

با وجود عدم اطمینان از امکان ترشح والسارتان در شیر، به دلیل ایجاد عوارض جانبی حایز اهمیت توسط این دارو، تجویز آن در دوران شیردهی توصیه نمی گردد.


نحوه بسته بندی

هر ۱۰ عدد قرص ۴۰ میلی گرمی (به رنگ سفید) و یا ۸۰ میلی گرمی (به رنگ قرمز) آدوان® در یک بلیستر و هر ۱۰ بلیستر به همراه یک برگه راهنما در یک جعبه مقوایی قرار دارد.

نگهداری

دارو را در ظروف کاملاً دربسته، در دمای پایین تر از ۲۵ درجه سانتی گراد، نگهداری کنید.

دارو را از رطوبت، گرما و نور مستقیم محافظت نمایید.



منابع

1. USPDI2010
2. MARTINDALE: the complete drug reference2011