



انرووت® ۵٪ (انروفلوكساسين)

شكل دارويی : محلول استريل تزريري

گروه دارويی : آنتي بيوتيك

تركيب دارو : هر ميلي ليتر دارو حاوي ۵۰ ميلي گرم انروفلوكساسين می باشد.

مکانیسم اثر دارو : انروفلوكساسين دارويی از نسل سوم فلوروکینولون ها می باشد که اساس عملکرد آن مهار آنزیم DNA-Gyrase در هسته سلول باكتري می باشد و DNA را به قطعات کوچک و غير فعال تبدیل می نماید و با ممانعت از همانندسازی DNA اثرات باكتريسيدي خود را اعمال می نمایند.

انروفلوكساسين ۵٪ دارای طيف اثر وسعي بوده و عليه باكتري هاي گرم منفي نظير اشرياكلى، كلبسيلا، سالمونيلا، پروتنيوس، كمبيلوباكتير، بردوتلا، پاستورلا، هموفيلوس، اكتينوباسيلوس، بروسلا، سودوموناس ائروفينوزا و باكتري هاي گرم مثبت نظير استافيلوكوك، استرپتوكوك، كوريئنه باكتريوم، كلستريديوم، ليسيريا منوسايتوزن، آركانوباكتريوم پيوژنر، اريزوپلورتريكس روزيپاتيه و مايكوبلاسما و كلاميديا موثر می باشد. ميزان حداقل غلظت موثر اين دارو در برابر اين اجرام پايان است که نتيجه اين ويژگي و فارماکوكينetic خاص مربوط به دارو، منجر می شود که سطح موثری از غلظت دارو به سرعت ايجاد شود.

فارماکوكونتيك دارو : پس از تزرير ميزان ۲/۵ ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن گوساله حداکثر بعد از يك ساعت غلظت انروفلوكساسين ۰/۹ ميلي گرم در هر ميلي ليتر سرم خواهد بود ولی همزمان، غلظت آن در بافت هايی از قبيل ريه، قلب، كبد، كلوي و سистем لنفاوي ۲-۳ برابر غلظت دارو در CSF است.

دارو هم از طريق كليوي و هم از راه غير كليوي دفع می شود. بين ۱۵-۵۰ درصد دارو بصورت تعغير نيافته از طريق ادرار (هم از طريق ترشح توبولي و هم از طريق فيلتراسيون گلومرولي) دفع می گردد و باقیمانده دارو از طريق مدفوع دفع می شود. نيمه عمر دارو ۳ ساعت است.

موارد مصرف دارو :

گاو، گوسفند، بز و خرگوش : در پیشگیری و درمان عفونت‌های ثانویه مایکوپلاسمایی و باکتریایی دستگاه تنفس (مایکوپلاسما، پاستورلا، هموفیلوس، استافیلوكوک) و گوارش (اشرشیاکلی، سالمونلا) کاربرد دارد. همچنین در درمان بروونکوپنومونی انژوئتیک گوساله‌ها نتایج بسیار خوبی دیده شده است.

سگ و گربه: عفونت‌های باکتریایی تنفس، گوارش، ادراری-تناسلی، پوستی و التهاب گوش خارجی ناشی از اشرشیاکلی، سالمونلا، پاستورلا، هموفیلوس، استافیلوكوک، استرپتوکوک و... کاربرد دارد. تجویز دارو به صورت زیر جلدی و در مورد گوسفند و بز به صورت داخل عضلانی می‌باشد.

گاو، گوسفند، بز و خرگوش : ۱ میلی‌لیتر به ازای هر ۲۰ کیلوگرم وزن بدن به مدت ۳-۵ روز (در درمان عفونت‌های پیچیده میزان دارو تا ۲ برابر افزایش می‌یابد).

سگ و گربه : ۱ میلی‌لیتر به ازای هر ۱۰ کیلوگرم وزن بدن به مدت ۵ روز (در درمان عفونت‌های پیچیده می‌تواند تا ۱۰ روز افزایش یابد).

موارد منع مصرف دارو :

در گربه‌های زیر ۸ ماه، سگ‌های زیر ۱ سال، سگ‌های نژاد بزرگ با دوره رشد طولانی زیر ۱۸ ماه توصیه نمی‌شود. در سگ‌های آبستن و شیروار و سگ‌ها با اختلالات سیستم اعصاب مرکزی منع مصرف دارو وجود دارد. در اسب‌ها و دام‌ها با اختلالات غضروف و مفصلی نباید بکار رود.

دوره پرهیز از مصرف :

گوشت : ۷ روز پس از آخرین تزریق دارو

شیر : ۴ روز پس از آخرین تزریق دارو

شرایط نگهداری دارو : در دمای (۱۵-۲۵) درجه سانتی گراد و دور از نور نگهداری شود.

بسته بندی دارو : در ویال‌های ۵۰ میلی‌لیتری در جعبه‌های یک عددی عرضه می‌گردد.