



جکتامین® (ویتامین AD₃E فورت)

شکل دارویی: محلول استریل تزریقی

گروه دارویی: ویتامین‌های محلول در چربی

ترکیب دارو: هر میلی‌لیتر دارو حاوی:

ویتامین A (پالمیتات) ۸۰/۰۰۰ واحد بین‌المللی

ویتامین D₃ (کوله کلسیفرول) ۴۰/۰۰۰ واحد بین‌المللی

ویتامین E (آلفاتو کوفرول استات) ۲۰ میلی‌گرم

مکانیسم اثر دارو: ویتامین‌های گروه AD₃E، محلول در چربی می‌باشند.

ویتامین A نقش موثری در محافظت و نگهداری سلول‌های اپی‌تلیال بدن دارد. همچنین در بینایی، باروری و روند اسپرmatوژنز و رشد استخوان‌ها و مقاومت بدن نقش مهمی را ایفا می‌کند.

ویتامین D₃ با افزایش و بهبود جذب کلسیم و فسفر، در مینرالیزاسیون و کلسیفیکاسیون استخوان‌ها و دندان‌ها نقش مهمی دارد.

ویتامین E با جلوگیری از اکسیداسیون اسیدهای چرب غیراشباع و ویتامین A موجود در روده، به عنوان یک آنتی‌اکسیدان عمل کرده و نقش مهمی در رشد، افزایش مقاومت بدن و باروری دارد.

حیوانات هدف:

اسب، گاو، گوسفند، بز، سگ و گربه

موارد مصرف دارو:

جهت پیشگیری و درمان علائم کمبود ویتامین‌های A، D₃، E از جمله اختلالات رشد و استخوان‌سازی، استئومالاسی، ریکتز، اختلالات غیر عفونی دستگاه تولیدمثل، ضعف‌های عضلانی و دام‌های زمین‌گیر، بیماری‌های مخاطی دهان و چشم، رفع اسپاسم و گرفتگی‌های عضلانی، اختلالات بینایی از قبیل شب‌کوری و کراتینه شدن قرنیه چشم، التهاب‌های روده‌ای، ناراحتی‌های پوستی و دوره نقاهت بیماری مصرف می‌گردد.

مقدار و روش مصرف:

این دارو به صورت تزریق عضلانی و زیر جلدی با مقادیر زیر تجویز می‌گردد.

گاو و اسب: از ۲۰۰ کیلوگرم به بالا ۱۰-۵ میلی‌لیتر

گوساله و کره‌اسب: تا ۲۰۰ کیلوگرم ۵-۲ میلی‌لیتر

گوسفند و بز: از ۲۰ کیلوگرم به بالا ۴-۲ میلی‌لیتر

بره و بزغاله: تا ۲۰ کیلوگرم ۲-۱ میلی‌لیتر

سگ و گربه: ۲-۰/۲ میلی‌لیتر

- در صورت نیاز، تزریق دارو ۳ ماه بعد تکرار شود.
- در موارد درمانی می‌توان تزریق را با فاصله کمتری تکرار کرد.
- در گاوهای آبستن ۳-۴ هفته قبل از زایمان، تزریق یک دوز از دارو ضروریست.

دوره پرهیز از مصرف دارو: ندارد

شرایط نگهداری دارو: در دمای (۲۵-۸) درجه سانتی‌گراد و دور از نور نگهداری شود.

بسته بندی دارو: در ویال‌های ۵۰ میلی‌لیتری در جعبه‌های یک عددی عرضه می‌گردد.