



وتامینازن® (دیمینازن استوریت)

شکل دارویی : محلول استریل تزریقی

گروه دارویی : ضد انگل تک یاخته خونی

ترکیب دارو : هر میلی لیتر حاوی ۷۰ میلی گرم دیمینازن استوریت می باشد .

مکانیسم اثر دارو : وتامینازن جهت درمان شیمیایی تریپانوزوما مؤثر می باشد. این دارو به صورت غیر قابل برگشت بر روی چرخه زندگی پیرو پلازما مؤثر است و در موارد نادر در بعضی از گونه ها یک تزریق کافی نبوده و درمان باید بعد از ۲۴-۱۲ ساعت دوباره تکرار شود .

موارد مصرف دارو : وتامینازن جهت درمان گونه های مختلف بازبور مانند *B.canis* ، *B.bovis* و *B. ovis* ، *B.equi* همچنین درمان تریپانوز و میازیس ناشی از *T.theileri* ، *T.evansi* ، *T. equinum* ، *T.congolense* و *T. vivax* ، *T. equiperdum* به کار برده می شود .

این دارو در تمام گونه های حیوانات برای درمان بابزیر و تریپانوزو میازیس عضلانی و زیر جلدی استفاده می شود . این دارو در اسب فقط به صورت عضلانی توصیه می گردد . دوز درمانی این دارو بسته به نوع انگل و مقاومت آن در گونه های مختلف از ۲/۵ تا ۷ میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن دام زنده به صورت تزریق عضلانی یا زیر جلدی استفاده شود .

زمان پرهیز از مصرف دارو : تا ۲۱ روز پس از درمان با وتامینازن از مصرف گوشت دام ذبح شده خود داری شود .

شرایط نگهداری دارو : در دمای (۳۰-۵) درجه سانتیگراد و دور از نور نگهداری شود .

بسته بندی دارو : این دارو در ویال های ۵۰ میلی لیتری در جعبه های یک عددی عرضه میگردد .