



## وتانیل تزریقی® ( فنیل بوتازون )

شکل دارویی : محلول استریل تزریقی

گروه دارویی : ضد التهاب غیر استروئیدی (NASI)

ترکیب دارو : هر میلی لیتر حاوی ۲۰۰ میلی گرم فنیل بوتازون میباشد .

**مکانیسم اثر دارو :** فنیل بوتازون یک عامل ضد التهابی است که دارای خواص ضد درد و ضد تب نیز می باشد . این دارو فعالیت آنزیم سیکلواکسیژناز را مهار نموده و به دنبال آن از تبدیل اسید آراشیدونیک به متابولیت های پروستاگلندین جلوگیری می نماید . اثر آنتاگونیستیک آن بر روی این آنزیم به طور غیر قابل برگشت میباشد .

**موارد مصرف دارو :** فنیل بوتازون یک عامل برای تسکین حالات التهابی که در ارتباط با سیستم استخوانی عضلانی هستند از قبیل آرتريت ، استئوآرتريت ، لامینایتیس ، تاندونایتیس ، میوزیت در گاو ، اسب و سگ به کار میرود . هم چنین می تواند به عنوان یک داروی کمکی در تسکین التهاب مربوط به سندرم دیسک بین مهره ای در سگ مورد استفاده قرار گیرد .

این دارو باید از راه وریدی و به آهستگی یا عضلانی عمیق تجویز گردد .

**دوز معمول گاو :** ۹ میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن

**دوز معمول اسب :** ۲/۲ تا ۴/۴ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن ( این مقادیر نباید بیش از ۵ روز متوالی تجویز گردد ) .

**دوز معمول سگ :** ۲۲ میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن ( تزریقات داخل وریدی باید به ۳ روز متوالی محدود باشد ) .

**موارد احتیاط :** این دارو نباید از طریق زیر جلدی تزریق شود .

درمان اسب های مسابقه باید حداقل ۸ روز قبل از شرکت در مسابقه اسب دوانی متوقف گردد .

**تداخل دارویی :** این دارو نباید همراه با آدنوکورتیکوئید ها ، سایر داروهای ضد درد و ضد التهاب غیر استروئیدی ، دی پیرون ، سالیسیلات ها و هورمون های تیروئید تجویز گردد .

**شرایط نگهداری دارو :** در دمای ( ۱۵-۲۵ ) درجه سانتیگراد و دور از نور نگهداری شود .

**بسته بندی دارو :** این دارو در ویال های ۵۰ میلی لیتری در جعبه های یک عددی عرضه می گردد .