

شیاف استامینوفن

شیاف ۱۲۵ میلی گرم و ۳۲۵ میلی گرم

مشخصات دارو:

شیاف های استامینوفن، حاوی ۱۲۵ میلی گرم و ۳۲۵ میلی گرم ماده ی موثره استامینوفن در پوشش آلومینیومی می باشند.

موارد مصرف دارو:

استامینوفن یک مسکن ضد التهاب است که در کنترل سر درد، دردهای عضلانی، درد دندان، آرتрит، سرماخوردگی و تب کاربرد دارد.

موارد منع مصرف:

در صورت بروز حساسیت پوستی مصرف دارو را قطع کنید و با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید. حساسیت های پوستی شدید با علائم زیر می باشد:

- قرمزی پوست
- راش جلدی
- تاؤل

هشدارها و احتیاطات:

- همراه با محصولاتی که حاوی استامینوفن هستند استفاده نشود.
- با مصرف این دارو ممکن است آسیب کبدی ایجاد شود. (مراجعه به بخش عوارض جانبی)
- قبل از مصرف این دارو در شرایط زیر با داروساز یا پزشک خود مشورت کنید:
 ۱. ابتلا به نارسایی کبدی
 ۲. در صورت مصرف داروهای رقیق کننده خون مثل وارفارین
 ۳. در مصرف مصرف داروهای آرامبخش مانند باربیتورات ها
 ۴. در صورت مصرف داروهای مرع مانند کاربامازپین، فنوباریتال و فنی تونین
 ۵. تشدید تب یا عدم کاهش تب بعد از ۳ روز (در کودکان ۳ تا ۳۶ ماهه) و ۵ روز (در کودکان ۳ تا ۶ ساله) یا ۱۰ روز (کودکان بالای ۶ سال یا بزرگسالان)
 ۶. بروز علائم جدید
 ۷. وجود تورم یا قرمزی
 ۸. در صورت بارداری یا شیردهی

نحوه ی تجویز دارو:

مصرف در بزرگسالان:

کنترل درد و تب: ۶۵۰ میلی گرم هر ۴ تا ۶ ساعت از طریق مقعد حداکثر مقدار مجاز: ۴۰۰۰ میلی گرم در ۲۴ ساعت

مصرف در کودکان:

کنترل درد و تب:

در کودکان زیر ۳ سال دوز مصرفی توسط پزشک تعیین گردد.
۳-۶ سال: ۱۲۰ میلی گرم هر ۴-۶ ساعت تا حداکثر ۵ دوز در ۲۴ ساعت در صورت نیاز
۶-۱۲ سال: ۳۲۵ میلی گرم هر ۴-۶ ساعت تا حداکثر ۵ دوز در ۲۴ ساعت در صورت نیاز
بیشتر از ۱۲ سال: ۶۵۰ میلی گرم هر ۴-۶ ساعت تا حداکثر ۶ دوز در ۲۴ ساعت در صورت نیاز
حداکثر مقدار مجاز: زیر ۱۲ سال: ۵ دوز در ۲۴ ساعت
بالای ۱۲ سال: ۴۰۰۰ میلی گرم در ۲۴ ساعت

بارداری:

مصرف کوتاه مدت در تمامی مراحل بارداری بلامانع است.

شیردهی:

با احتیاط مصرف شود.

تداخلات دارویی:

در صورت مصرف هر یک از داروهای موجود در لیست زیر پزشک خود را آگاه سازید:

باربیتورات ها

اتانول

فنی تونین

ایزونیازید

سولفین پیرازون

وارفارین

لاموتریژین

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود.

۱. افزایش آنزیم های کبدی (قابل برگشت بعد از قطع مصرف دارو) ، آسیب کبدی مخصوصا در مصرف بیش از حد استامینوفن

۲. راش و حساسیت پوستی

شرایط نگهداری دارو:

در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت گردد.

دارو را در یخچال نگهداری ننمایید.

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.



ساخت شرکت داروسازی **ابوریحان** (سهامی عام)

172 MM

95 MM