

آمپول اکوازون®

دگز امتازون

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است ، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری ننمایید.

مشخصات دارو :

هر آمپول اکوازون® ۲ میلی لیتری حاوی ۸ میلی گرم دگز امتازون فسفات به صورت دی سدیم می باشد .

راهنمایی های عمومی :

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر ، با پزشک خود مشورت نمایید:

۱- سابقه حساسیت نسبت به کورتیکواستروئیدها

۲- بارداری یا قصد بارداری

۳- شیردهی

مقدار و نحوه مصرف دارو:

مقدار و نحوه مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ، دارو را طبق تجویز پزشک مصرف ننمایید .

مصرف در افراد سالمند به دلیل ریسک شکستگی استخوان و افزایش فشار خون با احتیاط صورت گیرد .
آماده سازی نمونه:

• دگز امتازون سدیم فسفات تزریقی می تواند با دکستروز تزریقی یا سدیم کلراید تزریقی مخلوط شده و به صورت انفوزیون وریدی تزریق گردد.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

• بارداری

- دگز امتازون از جفت عبور می کند و از نظر مصرف در دوران بارداری مطابق گروه بندی FDA رده C می باشد.

• شیر دهی

مشکلات خاصی در صورت استفاده از دوز پائین این دارو هنگام شیردهی مشاهده نگردیده است، به هر حال هنگام استفاده از مقادیر زیاد این دارو، به علت ترشح دارو به شیر و امکان بروز عوارض ناخواسته در نوزاد مانند توقف رشد و یا مهار تولید استروئیدهای آندوژن ، شیردهی توصیه نمی گردد.

عوارض جانبی:

- عوارضی که در صورت بروز نیاز به مراقبت پزشکی دارند:

- باشیوع کمر

افزایش قند خون

- نادر

سوزش، بی حسی و درد در نزدیکی محل تزریق ، نارسایی احتقانی قلب، بروز واکنشهای آلرژیک عمومی یا موضعی ، عفونت در محل تزریق، عدم تشخیص زمان و مکان . احساس سرخوشی ، هالوسیناسیون، اپیزودهای مانیک دپرسیو، افسردگی روحی یا پارانوئید، ناپیئایی ناگهانی

عوارض هنگام تزریق داخل وریدی

آنافیلاکسی، آرتیمی قلبی، قرمزی صورت یا سینه ، تشنج (تزریق سریع داخل وریدی دوز بالای کورتیکو استروئیدها می تواند باعث آژیوادم و یا واکنشهای آلرژیک، تشنج و آریتمی قلبی گردد). بررسی الکتروکاردیوگرام و در دسترس بودن تجهیزات و داروهای اورژانسی در این موارد توصیه می گردد.

• عوارضی که در خلال مصرف طولانی مدت بروز کرده و احتیاج به مراقبت پزشکی دارند:

• آکنه، کاتاراکت ، سندرم کوشینگ، افزایش فشارخون ، بی نظمی قاعدگی، ضعف عضلانی، استریا، آتروفی بافت جلدی یا زیر جلدی، کبودی غیر معمول ، خطوط بنفش قرمز بر روی بازوها، صورت، پاها، تنه، کشاله ران ، احتیاس ماریت و سدیم ، گلوکوم، مهار رشد(در کودکان) ، سندرم هیپوکالمی (ضعف و خستگی غیر معمول ، ضربان قلب نامنظم و درد عضلانی)، تاخیر در بهبود زخم، افزایش فشار داخل جمجمه ای ، عفونت چشمی ثانویه قارچی یا ویروسی، یوکی استخوان یا شکنندگی استخوان، پانکراتیت (تهوع و استفراغ و درد شکمی) ، زخم پپتیک یا سوراخ شدن روده، ایجاد زخم در محل تزریق ، ضعف عضلانی ، پارگی تاندون، نازک و شکننده شدن پوست.

• عوارضی که در صورت استمرار و ایجاد ناراحتی باید مورد توجه قرار گیرند:

- باشیوع بیشتر

• تحریک دستگاه گوارش، افزایش اشتها، سوء هضم ، عصبانیت ، بی قراری ، مشکلات خوابیدن، افزایش وزن.

- عوارض با شیوع کمتر و یا نادر

• تغییر رنگ پوست و کاهش پیگمانهای پوستی، گیجی و سردرد خفیف، برافروختگی صورت یا سینه، سردرد، سکسکه، افزایش درد عضلانی

نکته: تغییر رنگ پوست ممکن است در ناحیه تزریق مشاهده شود.

• برافروختگی صورت و سینه ۴۸- ۲۴ ساعت ماندگار است.

• افزایش درد مفاصل ساعاتی بعد از تزریق شروع شده و حداکثر تا ۴۸ ساعت باقی می ماند.

• عوارضی که بعد از قطع مصرف بوجود آمده و نیاز مند بررسی پزشکی هستند:

• سندرم قطع مصرف مانند درد پشت و شکم، گیجی، غش، سردرد، تب ملایم ، درد عضلانی یا درد مفاصل، تهوع، از دست دادن فلان مدت طولانی مدت اشتها، کاهش سریع وزن و ...
• نکته: بعد از مصرف طولانی مدت این دارو در صورت قطع مصرف با پزشک مشورت نمایید .

هشدارها :

- این دارو در صورت وجود مشکلات پزشکی زیر غیر از موارد خاص نباید مصرف گردد:

- در تزریق داخل مفصلی

• سابقه آرتروپلاستی ، مشکلات استخوانی خون ، شکستگی داخل مفصل، سابقه ابتلا به عفونت پیرامون مفصل یا سابقه ابتلا به آن ، یوکی استخوان اطراف مفصل به دلایل غیر از آرتريت، مفصل ناپایدار .
• در صورت وجود مشکلات زیر منافع مصرف در مقابل مضرات مصرف آن باید توسط پزشک سنجیده شود:

•نقص ایمنی اکتسابی (ایدز)

•بیماریهای قلبی، نارسایی احتقانی قلب ، فشار خون بالا، ابتلا به بیماری ، عملکرد کلیوی شدید، ابتلا به آبله مرغان یا سرخک، کولیت، ازوفاژیت، گاستریت، زخم پپتیک فعال یا نهفته، دیابت ملیتوس، عفونت قارچی سیستیک ، گلوکوم زاویه باز ، بیماری کبدی یا نقص عملکرد کبدی ، هرپس سیمپلکس چشمی، افزایش لیبیدهای خونی، حساسیت به کورتیکواستروئیدها، هایپرتریونیدی، هیپوآلبومینی، هیپوتیرونیدی، میاستنی گراویس، حملات قلبی اخیر ، یوکی استخوان ، سایکوز حاد، وجود سنگ کلیوی، لوپوس اریترماتوز سیستیک ، سل فعال یا سابقه ابتلا به سل (حتی تست پوستی مثبت)

• در خلال مصرف این دارو نکات زیر را مورد توجه قرار دهید:

•ویزیت منظم پزشک و کنترل روند بهبود

•قطع مصرف دارو باید تحت کنترل پزشک باشد. (کاهش مصرف دارو طبق برنامه)

•در صورت برگشت ویا بدتر شدن علائم بعداز کاهش یا قطع مصرف دارو جریان را به پزشک خویش اطلاع دهید.

• بیمارانی که طولانی مدت از این دارو مصرف می کنند موارد زیر باید مورد توجه قرار دهند :

- محدودیت مصرف سدیم یا مکملهای حاوی پتاسیم

- محدودیت کالری دریافتی

- افزایش دریافت پروتئین

- معاینات چشم پزشکی

- احتیاط در انجام تستهای پوستی

- احتیاط در هر نوع جراحی یا هر نوع درمان پزشکی اورژانس

- احتیاط در هر نوع بیماریهای عفونی جدی یا جراحیهای پیش آمده

- پرهیز از قرار گرفتن در معرض ویروس آبله مرغان یا سرخک (خصوصاً در کودکان) و در صورت مواجهه،موضوع را سریعاً به پزشک خویش اطلاع دهید.

- احتیاط در واکنشهای ایمن سازی و احتیاط در مواجهه با فرد دریافت کننده واکسن خوراکی ویروسی

• در بیماران مبتلا به دیابت امکان افزایش غلظت قند خون می باشد.

•تزریق داخل موضع ، در صورت ایجاد قرمزی و یا تورم و یا بدتر شدن شرایط به پزشک خود اطلاع دهید .
•مصرف طولانی مدت این دارو در کودکان به علت امکان مهار رشد توصیه نمی گردد.

تداخلات دارویی :

در صورت مصرف سایر داروها خصوصاً داروهای زیر، پزشک خود را در جریان قرار دهید:

آمینوگلوکتیسماید، آمفوتریسین B تزریقی، آنتی اسیدها، آنتی بیوتیکهای ماکرولیدی، آنتی کوآلیتیک ها خصوصاً آتروپین و ترکیبات وابسته، ترکیبات القاء کننده آنزیمهای کبدی، ترکیبات مهار کننده آنزیمهای کبدی، ریتودرین ، سیکلوسپورین و سایر مهارکننده های سیستم ایمنی، ایزونیازید، کتوکونازول، میتوتان، ریتودرین ، ترکیبات دارویی یا غذایی حاوی سدیم، سوماتریتان، انسولین و داروهای دیورتیک (مدر) و گلیکوزیدهای قلبی مانند دیگوکسین و داروهای ضد دیابت خوراکی و واکنشهای ویروسی زنده

شرایط نگهداری:

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰°C ، دور از نور نگهداری و از یخ زدگی محافظت ننمایید.

- دارو را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

ساخت شرکت داروسازی **ایوربحان** (سهامی عام)



235 MM

98 MM