

پماد و کرم جلدی بتامتازون ۱/۰٪

بتامتازون والرات

مشخصات دارو:

در هر ۱۰۰ گرم پماد و کرم بتامتازون، ۱/۰ گرم بتامتازون والرات به عنوان ماده فعال دارویی وجود دارد.

دسته دارویی:

ضد التهاب موضعی (کورتیکواستروئید)

موارد مصرف:

بتامتازون برای درمان علامتی اختلالات آلرژیک و یا التهابی پوست نظیر اگزما که به سایر کورتیکواستروئیدهای ضعیفتر پاسخ نمی‌دهند، انواع درماتیت، نیش حشرات و پسوریازیس به کار می‌رود.

مقدار و نحوه مصرف دارو:

از آنجایی که میزان جذب دارو از پوست به پایه مورد استفاده (کرم یا پماد)، مدت زمان تماس دارو با پوست، سطح تماس دارو با پوست و وضعیت پوست بستگی دارد، مقدار مصرف دارو برای بیمار را پزشک تعیین میکند ولی میزان متعارف آن در کودکان یکبار در روز و کمتر از ۱۵ گرم در هفته و در بزرگسالان یک تا سه بار در روز و کمتر از ۵۰ گرم در هفته می باشد.

• در صورتی که یک نوبت استفاده از دارو را فراموش نمودید به محض یادآوری استفاده کنید اما اگر نوبت بعدی فرارسیده است از دو برابر نمودن دوز دارو خودداری نمایید.

توصیه های دارویی بتامتازون موضعی:

از به کار بردن پوشش و یا پانسمان روی ناحیه تحت درمان با بتامتازون خودداری شود.

– در صورتی که با گذشت دو هفته عارضه‌ای که برای آن بتامتازون تجویز شده، بهبود پیدا نکرد و یا بدتر شد، حتماً به پزشک اطلاع داده شود.

– قبل از شیردهی از استعمال این دارو روی بافت پستان خودداری شود.

– از مصرف دارو در اطراف چشم‌ها اجتناب شود.

موارد منع مصرف:

در صورت سابقه حساسیت به این دارو و سایر کورتیکواستروئیدها.

در صورت مصرف بعنوان داروی تک درمانی برای عفونت های باکتریایی نظیر زرد زخم در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

مصرف در بارداری و شیردهی:

بارداری: رده C

استعمال این دارو در بارداری و شیردهی با احتیاط و تنها با توصیه پزشک می باشد.

موارد هشدار و احتیاط:

– مصرف این دارو روی پوست کودکان باید با احتیاط صورت گیرد.

– به دنبال مصرف این دارو ممکن است تست‌های بررسی عملکرد محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-غده فوق کلیوی دچار اختلال شود.

– مصرف مقادیر بیش از ۱۰۰ گرم در هفته از فرآورده ۱/۰٪ با احتمال تضعیف آدرنال همراه می‌باشد.

– از مصرف طولانی مدت فرآورده روی پوست اجتناب گردد.

– قدرت اثر پماد بیشتر از کرم میباشد لذا مصرف پماد در صورت، زیر بغل و پهلوها توصیه نمی شود.

– مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی شود مگر به تشخیص پزشک متخصص.

– طبق دستور از دارو استفاده کنید و از پانسمان خود سرانه ضایعه خودداری کنید (مگر به تشخیص پزشک متخصص).

پانسمان جذب دارو را خصوصاً در کودکان افزایش میدهد.

– در موارد وجود عفونت از استروئیدها به همراه آنتی بیوتیک و یا داروهای ضد قارچ استفاده کنید. اگر نتیجه درمان رضایت بخش نباشد، مصرف استروئید را تا زمان درمان عفونت باید قطع نمود.

تداخلات دارویی:

استفاده از دو داروی کورتیکواستروئیدی موضعی بصورت هم زمان باعث تشدید عوارض جانبی می گردد

سمیت / عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، لیکن در صورت بروز هر عارضه ای با پزشک مشورت کنید:

به دلیل کم بودن متابولیسم بتامتازون در پوست، امکان جذب سیستمیک آن زیاد می‌باشد و لذا بروز عوارضی نظیر سندرم کوشینگ، افزایش قند خون، وجود قند در ادرار و در درازمدت تضعیف محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-غده فوق کلیوی محتمل می‌باشد.

شرایط نگهداری دارو:

در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید. دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری کنید.

پس از هر بار مصرف درب تیوب را محکم ببندید.

