

# آمپول دیکلوژین®

دیکلوفاک ۷۵ میلی گرمی

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است ، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری فرمایید.

## مشخصات دارو :

هر آمپول دیکلوژین® حاوی ۷۵ میلی گرم دیکلوفاک سدیم می باشد .

## راهنمایی های عمومی :

۱- قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید.

۱-۱ سابقه آلرژی به آسپرین یا ایبوپروفن و یا هر یک از ضد التهاب های غیر استروئیدی و یا سابقه بیماری آلرژیک از جمله آسم

۱-۲ در صورت بارداری یا شیردهی یا قصد باردار شدن

۱-۳ در صورت وجود اختلالات خونی ، خونریزی ، بیماریهای قلبی و قلبی- ریوی ، سابقه فشار خون بالا، اختلالات کبدی و کلیوی ، مشکلات انعقادی ، زخم ها یا التهاب های گوارشی و یا زخم گوارشی فعال و یا خونریزی دستگاه گوارشی ، سابقه سکنه ، سابقه مشکلات گوارشی و یا دل درد با مصرف داروهای ضد درد و التهاب مشابه

## مصرف در دوران بارداری و شیردهی :

در خصوص مصرف این دارو در دوران بارداری منافع مصرف در برابر مضرات مصرف سنجیده شود و در سه ماهه آخر بارداری ممنوع می باشد .

به دلیل ترشح این دارو در شیر در دوران شیردهی مصرف نشود .

## هشدارها :

۱- از تزریق وریدی این دارو اجتناب کنید.

۲- این دارو نباید بیشتر از دو روز مصرف شود و از مخلوط کردن این فرآورده با سایر داروهای تزریقی پرهیز نمایید.

۳- مصرف دارو در کودکان کمتر از ۱۵ سال ممنوع است.

۴- در صورت مشاهده کریستال و یا رسوب از تزریق خودداری شود.

۵- دارو در مراکز درمانی و تحت نظر پزشک تزریق شود.

۶- در صورت وجود اختلالات خونی ، دپرسیون مغز استخوان ، پولیب های بینی همراه با برونکواسپام بهتر است این دارو مصرف نشود.

۷- در صورت وجود آسم ، بیماریهای احتقانی قلب ، ادم ، فشار خون بالا ، نقص کبدی و کلیوی ، هموفیلی و زخم های گوارشی ، مصرف باید با احتیاط و براساس تشخیص سود و زیان برای بیمار تجویز شود.

۸- خاصیت ضد درد ، تب و ضد التهاب این دارو ممکن است باعث پوشاندن علائم عفونت و بدتر شدن آن گردد.

۹- در صورت مشاهده علائم زیر دارو را قطع و با پزشک تماس بگیرید:

گیجی ، خواب آلودگی ، احساس سبکی سر ، مشکلات بینایی ، علائم شبیه آنفلوانزا همراه با راش های پوستی

• ۱-به علت وجود بنزیل الکل، مصرف این دارو در نوزادان ممنوع می باشد .

## مقدار و نحوه مصرف دارو :

در خصوص مقدار و نحوه مصرف دارو با پزشک خود مشورت نمایید .

## عوارض جانبی :

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز می گردد. گرچه کلیه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز هر یک از موارد زیر با پزشک تماس بگیرید.

- درد معده، سوء هاضمه، سوزش سر دل، تهوع (احساس ضعف) یا استفراغ
- هر علامت خونریزی در معده یا روده، به عنوان مثال خون در استفراغ یا مدفوع سیاه و سفید
- واکنش های آلرژیک که می تواند شامل خارش پوست، خارش، کبودی، مناطق قرمز دردناک باشد .
- تنگی نفس (برونکواسپاسم)
- تورم صورت، لب ها، دست ها یا انگشتان دست
- زردی پوست یا سفید شدن چشم ها
- گلو درد پایدار یا درجه حرارت بالا
- تغییر غیر منتظره ای در میزان تولید ادرار و یا ظاهر آن.

## تداخلات دارویی و اثر بر پاسخ تست های آزمایشگاهی :

مصرف همزمان و طولانی مدت با استامینوفن خطر عوارض جانبی کلیوی را زیاد می کند . مصرف همزمان با کورتیکواستروئیدها و مکمل های حاوی پتاسیم خطر عوارض گوارشی را زیاد می کند . مصرف همزمان با ضد انعقادهای خوراکی ، هپارین و ترمبولیتیک ها احتمال خونریزی را زیاد می کند . مصرف همزمان با ضد دیابت ها ممکن است اثر پائین آورنده قند خون آنها را تشدید کند . مصرف همزمان با سایر ضد التهاب های غیر استروئیدی و آسپرین باعث افزایش سمیت گوارشی و احتمال خونریزی می شود. مصرف همزمان با لیتیم باعث افزایش غلظت خونی آن می شود. همچنین این دارو باعث افزایش غلظت پلاسمایی دیگوکسین می شود.

این دارو میزان ترانس آمیناز و غلظت اسید اوریک ادرار را افزایش می دهد.

## شرایط نگهداری :

دارو را دور از نور و داخل جعبه و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید .

ساخت شرکت داروسازی **ابوریحان** تهران-ایران



220 MM

98 MM