

پماد و کرم جلدی فلئوسینولون استوناید ۰/۰۲۵٪

مشخصات دارو:

فلئوسینولون استوناید از دسته ی داروهای کورتیکواستروئیدی می باشد. پماد و کرم ۱۵ گرمی این دارو حاوی ۰/۰۲۵ گرم فلئوسینولون استوناید به عنوان ماده ی موثره در هر ۱۰۰ گرم می باشد.

موارد مصرف دارو:

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است ، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و توصیه آن به دیگران خودداری نمایید .
فلئوسینولون استوناید در درمان علامتی اختلالات آلرژیک و یا التهابی پوست نظیر اگزما، انواع درماتیت، لوپوس اریتماتوز، پسوریازیس، نیش حشرات و پمفیگوس بکار می رود.

مقدار و نحوه ی مصرف دارو:

دارو را طبق تجویز پزشک مصرف نمایید.
مقدار مصرف معمول این دارو به قرار زیر است:
بزرگسالان: ۴-۲ بار در روز بر روی ضایعه پوستی مالیده شود.
کودکان: کمترین دوز موثر مورد مصرف قرار گیرد زیرا مصرف بلند مدت این دسته داروها می تواند در رشد کودکان اختلال ایجاد کند.

موارد منع مصرف:

در صورت سابقه حساسیت به فلئوسینولون استوناید از مصرف دارو خودداری نمایید.

هشدارها و احتیاطات:

راهنمای های عمومی برای مصرف صحیح دارو:

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت نمایید:
- وجود هر گونه حساسیت به فلئوسینولون استوناید یا سایر داروهای کورتیکواستروئیدی
- در صورت ابتلا به سل ، دیابت ، گلوکوم و آب مروارید (کاتاراکت) .
- وجود عفونت یا زخم در محلی که پماد مالیده می شود و یا مواردی که پوست نازکتر از معمول شده است.
- از تماس دارو با چشمها خودداری کنید. در صورت تماس احتمالی دارو با چشمها، سریعا چشمهای خود را با آب بشویید.
- از بکار بردن پانسمان یا روکش دیگر بر روی ناحیه تحت درمان خودداری کنید مگر اینکه پزشک تجویز کرده باشد.
- دارو را بیش از مقدار تجویز شده مصرف نکنید.
- از مصرف دارو برای مشکلات پوستی دیگر بدون مشورت با پزشک خودداری کنید.
- مصرف این دارو در کودکان بمدت بیش از دو هفته و یا مصرف بیش از یکبار در روز و یا در وسعت زیاد از سطح بدن حتما باید طبق نظر پزشک معالج و با احتیاط زیاد صورت گیرد .

بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری تنها زمانی مجاز است که مزیت مصرف آن نسبت به خطرات آن برای جنین قابل توجیه باشد. با این حال مصرف این دسته داروها در خانم های باردار نباید در مقادیر بالا و یا مدت زمان طولانی صورت گیرد.
مصرف این دارو در شیردهی با احتیاط صورت گیرد.

عوارض جانبی:

مانند همه ی دارو های دیگر ، فلئوسینولون استوناید می تواند عوارض ناخواسته ای به دنبال داشته باشد، گرچه همه ی مصرف کنندگان این دارو این عوارض را تجربه نمی کنند لیکن در صورت بروز هر یک از عوارض زیر با پزشک مشورت کنید:

خونریزی زیر پوستی ، سوختگی و خارش و قرمزی پوست، بی حسی انگشتان، عفونتهای پوستی ، تازک شدن پوست همراه با پوسته ریزی، افزایش قند ادرار و خون، آکنه یا پوست چرب، کمردرد، افزایش فشار خون، دوره قاعدگی نامنظم، کاهش اشتها، گرفتگی عضلانی (درد یا ضعف عضلانی)، تهوع و استفراغ ، تغییر رنگ پوست ، پوسته ریزی غیر معمول، افزایش غیر معمول در رشد مو و بدتر شدن عفونت

شرایط نگهداری دارو:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.
دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید .
از مصرف دارو های تاریخ گذشته خودداری کنید.
پس از هر با مصرف درب تیوب را محکم ببندید.

