



وتازوماید® (فوروژماید)

شکل دارویی : محلول استریل تزریقی

گروه دارویی : دیورتیک

ترکیب دارو : هر میلی لیتر حاوی ۵۰ میلی گرم فوروژماید می باشد .

مکانیسم اثر دارو : فوروژماید اساساً "به وسیله مهار باز جذب فعال سدیم و آب در بخش بالا رونده قوس هنله عمل میکند و در نتیجه باعث افزایش دفع آب و نمک می گردد. در عین حال کاهش حجم پلاسمما باعث افزایش تولید آلدوسترون می شود. این افزایش انتقال مایع توبولی و از طرف دیگر میزان بالای آلدوسترون باز جذب سدیم در لوله های دیستال را تحریک کرده و بنا بر این باعث افزایش دفع یون های هیدروژن و پتاسیم می گردد .

موارد مصرف دارو : فوروژماید برای درمان سندروم ادم در موارد زیر کاربرد دارد .

خیز احتقانی یا پرخونی وریدی ناشی از نارسایی قلبی ، انسداد جریان وریدی یا جریان لنفاتیک در اثر ترومبوز ، برای درمان ادم ناشی از کمبود پروتئین (کم شدن پروتئین درخون) در اثر هدر رفتان پروتئین با منشا کلیوی با وجود انگل ، سوء تغذیه که باعث بروز ادم سرتاسری پوست و آسیت میشود ، برای درمان ادم فیزیولوژیک پستان و پرینه در گاو و مادیان در زمان زایمان و ادم غلاف و کیسه بیضه در حیوانات نر ، درمان حمایتی در دفع مایعات در دفع مایعات جمع شده در حفرات بدن (قفسه ، مغز ، شکم) و هم چنین اعضای حفره دار بدن مثل مفاصل ، غلاف تاندون ها یا بورس ، درمان حمایتی در لامینایتیس ، میوگلو بینوری و پارالیتیک در اسب ها و یا آبستنی های کاذب در سگ ها .

مقدار و روش مصرف دارو:

محلول وتابزماید ۵ درصد را باید از طریق داخل وریدی یا داخل عضلانی تجویز نمود .

دوز معمول :

گربه و سگ : ۵/۵- ۲/۵ میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن ۱-۲ بار در روز به فواصل ۶-۸ ساعت .

گاو : ۱-۵/۰ میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن ، ۱-۲ بار در روز به فواصل ۱۲-۱۴ ساعت .

اسب : ۰/۵ میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن ۱-۲ بار در روز به فواصل ۶-۸ ساعت .

موارد عدم مصرف دارو : استفاده از و تازوماید در موارد نارسایی کلیوی همراه با قطع ادرار ، ضایعات شدید کبدی ، گلومرولونفریت حاد ، نارسایی کبدی ، احتمال بروز هیپوکلسما ، کم ادراری با حضور حالت دزهیدراتاسیون قابل توجه و در سگ ها و مادیان های آبستن و نریان هایی که به منظور اصلاح نژاد نگهداری میشوند ، در زمان کاهش غلظت پتابسیم خون ممنوع است .

تجویز و تازوماید در طول سه ماهه آبستنی توصیه نمی گردد .

تداخل دارویی : استفاده از سالیسیلات ها با مقادیر بالا با فوروزماید ممکن است منجر به مسمومیت با سالیسیلات گردد . این دارو نباید همراه با آمفوتربیسین B، هیدرات کلرال و داروهای ضد التهاب تجویز گردد .

شرایط نگهداری دارو : در دمای (۱۵-۲۵) درجه سانتیگراد و دور از نور نگهداری شود .

بسته بندی دارو : این دارو در ویال های ۱۰ میلی لیتر در جعبه های یک عددی عرضه می گردد .