



شرکت داروسازی ابوریحان

Aburaihan Pharmaceutical Co.

Health is Wealth

سلامتی سرمایه است

فلورفنیکل® ۳۰٪ (فلورفنیکل)

Florfenicol® 30% (florfenicol)

#### دسته دارویی:

آنتی‌بیوتیک وسیع الطیف (آنالوگ کلرامفنیکل)

#### شکل و ترکیب دارویی:

محلول تزریقی و هر میلی‌لیتر حاوی ۳۰۰ میلی‌گرم ماده فلورفنیکل می‌باشد.

#### فارماکولوژی و مکانیسم عمل:

فلورفنیکل یکی از مشتقات کلرامفنیکل می‌باشد که بر علیه باکتری‌های گرم منفی و گرم مثبت و مقاوم به کلرامفنیکل مؤثر می‌باشد. این دارو با تأثیر بر روی ریبوزوم‌ها، سنتز پروتئین‌ها را در باکتری مهار می‌کند و در مقابل آنزیم استیل ترانسفر از باکتری‌های مقاوم به کلرامفنیکل، غیر فعال نمی‌شود.

#### موارد مصرف:

این آنتی‌بیوتیک برای استفاده در گاو، گوسفند و بز علیه کمپلکس بیماری‌های تنفسی و تب حمل و نقل (پاستورلاهمولیتیکا، پاستورلا مولتوسیدا و هموفیلوس سامنوس)، اسهال گوساله‌ها، بیماری‌های پنومونتریت گوساله‌ها (کورینه باکتریوم پیوژنز، سالمونلاها، استروپتوکوک، کلسیلا)، گنبدگی سم، کراتوکونژکتیویت (pink-eye)، عفونت سیستم ادراری-تناسلی و بطور معمول عفونت‌های باکتریایی توصیه می‌شود. فلورفنیکل بر علیه میکرو ارگانیزم‌های بیماری‌زایی که به آنتی‌بیوتیک‌هایی مانند اکسی‌تراسیکلین‌ها، اکسولینیک اسید و کینولون‌ها مقاومند، مؤثر می‌باشد. مطالعات انجام شده حاکی از این است که این دارو نسبت به سایر آنالوگ‌های کلرامفنیکل و تیمافنیکل قویتر می‌باشد.

#### مقدار و طریقه مصرف:

**گاو:** دو روش وجود دارد.

۱. به صورت تک دوز: ۴۰ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن زنده دام (۲ میلی‌لیتر به ازای ۱۵ کیلوگرم وزن بدن) به صورت زیر جلدی.

۲. به صورت دوز تکراری: ۲۰ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن زنده دام (۱ میلی‌لیتر به ازای ۱۵ کیلوگرم وزن بدن) بصورت داخل عضلانی (فقط داخل عضله گردن) که تزریق دوم ۴۸ ساعت بعد از تزریق اول توصیه می‌شود. بهتر است که در یک نقطه از بدن بیش از ۱۰ میلی‌لیتر از حجم محلول تزریق نشود.

**گوسفند و بز:** برای درمان کمپلکس بیماری تنفسی ۲۰ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم بصورت عضلانی به مدت ۲ روز.

**سگ:** ۲۰-۲۵ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم بصورت عضلانی یا زیرجلدی هر ۸ ساعت یک تزریق به مدت ۳-۵ روز.

**گربه:** ۲۰-۲۵ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم بصورت عضلانی یا زیرجلدی هر ۱۲ ساعت یک تزریق به مدت ۳-۵ روز.

#### موارد منع مصرف:

در گاوهای مولد اسپرم و گاوهایی که برای اهداف تولید مثل استفاده می‌شود، منع مصرف دارد.



در گاوهایی که شیرشان به مصرف انسان می رسد، منع مصرف دارد.

### موارد احتیاط:

بیش از ۱۰ میلی لیتر تزریق در هر محل توصیه نمی شود. تزریق داخل وریدی ممنوع است. دور از دسترس کودکان نگهداری شود. از تماس مستقیم با چشم و پوست جلوگیری شود.

### زمان پرهیز از مصرف:


بایستی تزریق دارو از ۲۸ روز قبل از کشتار قطع شود و از مصرف شیر تا ۵ روز پس از تزریق خودداری گردد.


### شرایط نگهداری:

در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد و دور از نور نگهداری گردد. از انجماد جلوگیری شود.

### بسته بندی:

در ویال های ۵۰ میلی لیتری در جعبه های یک عددی عرضه می گردد.

 0098 21 7770 2066

 0098 21 7788 3198

 [info@aburaihan.com](mailto:info@aburaihan.com)  
[marketing\\_vet@aburaihan.com](mailto:marketing_vet@aburaihan.com)

 [www.aburaihan.com](http://www.aburaihan.com)