



شرکت داروسازی ابوریحان

Aburaihan Pharmaceutical Co.

Health is Wealth

سلامتی سرمایه است

وتازوماید® (فوروزماید)

**Vetazomide®** (Furosemide)

**دسته دارویی:** دیورتیک

**ترکیب و شکل دارو:** محلول تزریقی و هر میلی لیتر حاوی ۵۰ میلی گرم فوروزماید می باشد.

**مکانیسم عمل:**

فوروزماید اساساً به وسیله مهار باز جذب فعال سدیم و آب در بخش بالارونده قوس هنله عمل می کند و در نتیجه باعث افزایش دفع آب و نمک می گردد. در عین حال کاهش حجم پلاسما باعث افزایش تولید آلدوسترون می شود. این افزایش انتقال مایع توبولی و از طرف دیگر میزان بالای آلدوسترون، باز جذب سدیم در توبول های دیستال را تحریک کرده و بنابراین باعث افزایش دفع یون های هیدروژن و پتاسیم می گردد.

**موارد مصرف:**

وتازوماید® برای درمان سندرم ادم در موارد زیر کاربرد دارد:

خیز احتقانی با پرخونی وریدی ناشی از نارسایی قلبی، انسداد جریان وریدی یا جریان لنفاتیک در اثر ترومبوز، برای درمان ادم ناشی از کمبود پروتئین (کم شدن پروتئین در خون) در اثر هدر رفتن پروتئین با منشأ کلیوی یا کبدی همراه با اختلالاتی در متابولیسم پروتئین، وجود انگل یا سوء تغذیه که باعث بروز ادم سرتاسری پوست و آسیب می شود. برای درمان ادم فیزیولوژیک پستان و پرینه در گاو و مادیان در زمان زایمان و ادم غلاف و کیسه بیضه در حیوانات نر، درمان حمایتی در دفع مایعات جمع شده در حفرات بدن (قفسه سینه، مغز و شکم) و همچنین اعضای حفره دار بدن مثل مفاصل، غلاف تاندون ها یا بورس، درمان حمایتی در لامینایتیس، میوگلوبینوری و پارالیتیک در اسب ها و یا آبستنی های کاذب در سگ ها.

**مقدار و روش مصرف:**

محلول وتازوماید® ۵ درصد را باید به صورت داخل وریدی یا داخل عضلانی تجویز نمود.

**گربه و سگ:** ۵/۵- ۲/۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و ۱-۲ بار در روز به فواصل ۸-۶ ساعت.

**گاو:** ۱-۰/۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و ۱-۲ بار در روز به فواصل ۱۴-۱۲ ساعت.

**اسب:** ۱-۰/۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و ۱-۲ بار در روز به فواصل ۸-۶ ساعت.

**موارد عدم مصرف:**

استفاده از وتازوماید® در موارد نارسایی کلیوی همراه با قطع ادرار، ضایعات شدید کبدی، گلومرولونفریت حاد، نارسایی کبدی، احتمال بروز هیپوکلسمی، کم ادراری با حضور حالت دهیدراتاسیون قابل توجه و در سگ ها و مادیان های آبستن و نریان هایی که به منظور اصلاح نژاد

نگهداری می شوند، در زمان کاهش غلظت پتاسیم خون ممنوع است. تجویز وتازوماید® در طول سه ماهه دوم آبستنی توصیه نمی گردد.



### تداخل دارویی:

استفاده از سالیسیلات‌ها با مقادیر بالا همراه فوروزماید ممکن است منجر به مسمومیت با سالیسیلات گردد. این دارو نباید همراه با آمفوتریسین B، هیدرات کلرال و داروهای ضد التهاب تجویز گردد.

### زمان پرهیز از مصرف:


گوشت: ۲ روز بعد از آخرین تزریق.  
شیر: ۲ روز بعد از آخرین تزریق (چهار بار شیردهی).


### شرایط نگهداری:


در دمای ۲۵-۱۵ درجه سانتی‌گراد و دور از نور نگهداری شود. از انجماد دارو جلوگیری شود.  
تذکر مهم: در صورت مشاهده کریستال، محلول را به آرامی گرم نمایید.

### بسته بندی:

یک ویال ۱۰ میلی‌لیتری در جعبه‌های یک عددی.

 0098 21 7770 2066

 0098 21 7788 3198

 info@aburaihan.com  
marketing\_vet@aburaihan.com

 www.aburaihan.com