



شرکت داروسازی ابوریحان

Aburaihan Pharmaceutical Co.

Health is Wealth

سلامتی سرمایه است

وتاکوئید® (دگزامتازون)

Vetacoid® (Dexametazone)

**گروه دارویی:** ضد التهاب استروئیدی

**شکل دارویی:** محلول آبی تزریقی

**ترکیب:** هر میلی لیتر حاوی ۲/۳۶ میلی گرم دگزامتازون به صورت فسفات سدیم معادل ۲ میلی گرم دگزامتازون بیس می باشد.

**مکانیسم عمل:**

مانند سایر گلوکوکورتیکوئیدها مانع تجمع سلول‌های التهابی از جمله ماکروفاژ و لوکوسیت‌ها در محل التهاب شده و از فاگوسیتوز و آزاد شدن آنزیم‌های لیزوزیمی جلوگیری می‌کند و بدون تأثیر بر علل التهاب باعث کاهش واکنش‌های بافتی در روند التهاب می‌شود. مزیت اصلی و مهم این دارو به انواع مشابه نظیر بتامتازون و توانایی عبور آن از سد خونی مغزی می‌باشد.

**موارد مصرف:**

- کتوز گاوی (استوئمی)
- آرتریت‌های غیر عفونی (تاندونیت، استئوآرتریت)
- التهاب و تروسینوویال‌های وتری
- التهاب‌های جلدی بورسیت درماتیت
- واژینیت
- سندرم آمفیژم ریوی گاو
- پنومونی آتیبیک در گاو
- آلرژی
- اورام پستان (در اثر استرس)
- حالات شوک و استرس

**مقدار مصرف:**

در موارد حاد بیماری به صورت زیر توصیه می‌شود:

**اسب و گاو:** ۱۵-۵ میلی لیتر

**گوساله، گوسفند و بز:** ۲/۵-۱ میلی لیتر

**سگ:** ۱-۰/۲۵ میلی لیتر

**گربه:** ۰/۵-۰/۲۵ میلی لیتر

در صورت نیاز به فواصل ۲۴-۴۸ ساعت تکرار شود.



### نحوه مصرف:

این دارو به شکل وریدی، عضلانی، زیرجلدی و داخل مفصلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

### موارد عدم مصرف:

این دارو در مواقع وجود عفونت بدون استفاده از آنتی بیوتیک نباید مورد استفاده قرار گیرد. در سه ماه آخر آبستنی در گاو استفاده نگردد زیرا احتمال سخت‌زایی و یا سقط جنین را افزایش می‌دهد. از این دارو همراه با سایر داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی استفاده نشود.

### زمان پرهیز از مصرف:

گوشت: ۸ روز بعد از آخرین تزریق.

شیر: ۵ روز بعد از آخرین تزریق.

### شرایط نگهداری:

در دمای ۲۵-۱۵ درجه سانتی‌گراد و دور از نور نگهداری شود. از انجماد جلوگیری شود.

### بسته بندی دارو:

در ویال‌های ۵۰ میلی‌لیتری در جعبه‌های یک عددی عرضه می‌گردد.



0098 21 7770 2066



0098 21 7788 3198



info@aburaihan.com  
marketing\_vet@aburaihan.com



www.aburaihan.com