



شرکت داروسازی ابوریحان

Aburaihan Pharmaceutical Co.

Health is Wealth

سلامتی سرمایه است

وتاگلاندین® (دی-کلوپروستنول)

Vetaglandin® (D-Cloprostenol)

دسته دارویی: پروستاگلاندین

شکل و ترکیب دارویی: محلول تزریقی و هر میلی لیتر حاوی ۰/۰۷۵ میلی گرم دی-کلوپروستنول می باشد.

فارماکولوژی و مکانیسم عمل:

دی-کلوپروستنول آنالوگ سنتتیک پروستاگلاندین $F_{2\alpha}$ بوده و دارای کلیه اثرات آن می باشد. این دارو باعث انقباض میومتر و شل شدن گردن رحم و کاهش حجم رحم گردیده و در صورت تماس جسم زرد در روزهای ۴-۵ باعث تحلیل آن از نظر عملکردی و مورفولوژیکی می شود.

موارد مصرف:

وتاگلاندین® در موارد زیر در گاو و اسب مورد مصرف قرار می گیرد:

- اختلالات فیزیولوژیک تخمدان نظیر تأخیر در تخمک گذاری و عدم تخمک گذاری.
- تومورهای تخمدانی مزمن و کیست تخمدانی فولیکولار.
- اتمام بارداری و ایجاد سقط در بارداری های پاتوژنیک.
- ناراحتی ها و بیماری های رحمی بعد از زایمان.
- افزایش قدرت انقباض میومتر.
- آندومتریوز.
- عفونت های رحمی.



میزان و طریقه مصرف:

این دارو بصورت عضلانی تجویز می‌گردد.

دوز درمانی دارو در گاو ۲ میلی لیتر و در اسب ۱ میلی لیتر می‌باشد.

موارد عدم مصرف:

در درمان پیومتر در صورت بسته بودن گردن رحم با احتیاط مصرف گردد. زیرا احتمال پرتونیت در اثر پارگی رحم وجود دارد.

این دارو از راه پوست قابل جذب است. لذا در صورت تماس آن با زنان باردار و یا مبتلایان به آسم، به دلیل ایجاد اسپاسم در برونش‌ها از داروهای بازکننده برونش استفاده گردد.

در صورت تماس با پوست، موضع با آب شستشو داده شود.

در اسب امکان ایجاد تعریق، افزایش ضربان قلب و درد شکم وجود دارد.

انتظار می‌رود این دسته داروها در حیوانات دارای جسم زرد فعال، مؤثر باشند.

از تزریق وریدی دارو اجتناب گردد.

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت و سایر بافت‌ها: ۲۴ ساعت

شیر: ۱۲ ساعت

شرایط نگهداری:

در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد و دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود. از انجماد دارو جلوگیری شود.

بسته بندی:

ویال ۱۰ میلی لیتری در جعبه‌های ۵ عددی.



0098 21 7770 2066



info@aburaihan.com
marketing_vet@aburaihan.com



0098 21 7788 3198



www.aburaihan.com