



شرکت داروسازی ابوریحان

Aburaihan Pharmaceutical Co.

Health is Wealth

سلامتی سرمایه است

وتوسیدر (سیدر گاوی)

Vetocidr® Cidr

دسته دارویی: هورمونی

شکل و ترکیب دارویی: وسیله داخل واژن، هر وسیله حاوی ۱/۹ گرم پروژسترون.

مکانیسم اثر:

وتوسیدر® حاوی پروژسترون طبیعی بوده و با قرار دادن آن در داخل واژن به طور یکنواخت و در طول مدت معین پروژسترون را از خود آزاد می‌کند، پروژسترون آزاد شده نیز جذب دیواره واژن و نهایتاً خون دام شده و اثرات فارماکولوژیک خود را اعمال می‌نماید.

موارد مصرف:

- درمان کیست‌های تخمدان
- درمان عدم فعلی گاو (آنستروس)
- بهبود درصد آبستنی در گیرنده‌های جنین
- جهت همزمانی فعلی در گاو شیری و تلیسه و گیرنده‌های انتقال جنین
- ایجاد همزمانی در انتقال جنین برای گاوهای گیرنده و دهنده
- بهبود درصد آبستنی در گاوهای برگشتی (تلقیح سوم به بعد)

میزان و نحوه استفاده:

۱. **درمان عدم فعلی در گاوهای آنستروس:** قرار دادن وتوسیدر® به مدت ۸ روز و تزریق یک میلی گرم استرادیول بنزوات (وتاسترول®) در روز ۹ و متعاقب با آن مشاهده علائم فعلی، تلقیح در روزهای ۱۰-۱۲.
۲. **درمان کیست‌های تخمدانی:** قرار دادن وتوسیدر® به مدت ۱۲ روز و تلقیح دام در روزهای ۱۳-۱۴.
۳. **جهت همزمانی فعلی در گاو شیری و تلیسه و گیرنده‌های انتقال جنین:** قرار دادن وتوسیدر® و تزریق همزمان ۲ میلی گرم استرادیول بنزوات (وتاسترول®)، خارج نمودن وتوسیدر® بعد از ۸ روز و تزریق پروستاگلاندین (وتالایز® یا وتاگلاندین®) یک دوز در گاو شیری و نصف دوز در تلیسه، روز ۹ یک میلی گرم استرادیول بنزوات (وتاسترول®) و تلقیح در روز دهم (بدون مشاهده علائم فعلی).
۴. **ابقاء آبستنی:** قراردادی وتوسیدر® پنج روز بعد از تلقیح و خارج نمودن آن، دوازده روز بعد از تلقیح، سبب افزایش راندمان باروری می‌گردد.

۵. درمان و همزمانی برای تلقیح اجباری:

- روز صفر: جایگزاری وتوسیدر[®] + تزریق GnRH
- روز هفتم: خارج کردن وتوسیدر[®] و تزریق وتالایز[®] یا وتاگلاندین[®]
- روز نهم: تزریق دوم GnRH و ۱۸ ساعت بعد تلقیح اجباری

۶. **بهبود آبستنی در گیرنده‌های جنین منجمد:** همزمان با انتقال جنین منجمد، استفاده از وتوسیدر[®] به مدت ۷ روز می‌تواند باعث بالا رفتن درصد آبستنی گردد.

موارد منع مصرف:

- برای گاوهایی که دارای واژن طبیعی نمی‌باشند
- در گاوهایی که به دلایل مختلف دارای شرایط بدنی ضعیف می‌باشند

عوارض جانبی: مشاهده نگردیده است.


زمان پرهیز از مصرف: دوره منع مصرف برای شیر و گوشت وجود ندارد.

شرایط نگهداری:


در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد و به دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود.

یادآوری: از هر وتوسیدر[®] بیش از یک بار استفاده نشود.

بسته‌بندی: یک عدد وتوسیدر در یک پاکت

 0098 21 7770 2066

 0098 21 7788 3198

 info@aburaihan.com
marketing_vet@aburaihan.com

 www.aburaihan.com