



شرکت داروسازی ابوریحان

Aburaihan Pharmaceutical Co.

Health is Wealth

سلامتی سرمایه است

وتوسیدر<sup>®</sup> (سیدرگوسفندی)

Vetocider<sup>®</sup> cidr

شکل دارویی: وسیله داخل واژن

مکانیسم عمل

سیدر از جنس سیلیکون آغشته به پروژسترون طبیعی است که روزانه به میزان معین و ثابت (۲۳ میلی گرم) پروژسترون آزاد می‌کند. سیدر گوسفندی دارای ۳۳۰ میلی گرم پروژسترون بوده و بوسیله اپلیکاتور مخصوصی در واژن کار گذاشته می‌شود. پروژسترون هورمون طبیعی آزاد شده از جسم زرد تخمدان می‌باشد که پس از تخمک گذاری باقیمانده فولیکول به جسم زرد تبدیل می‌شود و باعث ادامه و تداوم آبستنی خواهد شد. وقتی که پروژسترون بصورت مصنوعی وارد می‌شود سبب فریب مکانیسم‌های کنترلی بدن شده، در نتیجه بدن حیوان ماده احساس می‌کند که حامله شده و حیوان دچار فعلی نشده و وارد فاز تخمک گذاری نمی‌شود. موقعی که منبع پروژسترونی کاملاً برطرف شده یا حذف می‌شود بدن احساس می‌کند که دیگر آبستن نیست و در یک دوره زمانی معین و مشخص تخمک گذاری را شروع می‌کند. این مواد عملکرد جسم زرد تخمدانی را تقلید می‌کنند.

موارد مصرف:

- شامل کنترل همزمانی فعلی
- اوولاسیون در داخل و خارج از فصل جنسی
- ازدیاد دوقلو زایی

روش مصرف:

نوع دام		برنامه درمانی	
بز	بره میش‌های بالغ		
قرداد دادن وتوسیدر	قرداد دادن وتوسیدر	روز صفر	فصل آمیزش
خارج کردن وتوسیدر و تزریق عضلانی PMSG ۴۰۰-۵۰۰ واحد بین المللی	خارج کردن وتوسیدر و تزریق عضلانی PMSG ۲۰۰-۳۰۰ واحد بین المللی	روز ۱۲-۱۴ (برای میش)	
		روز ۱۷-۱۹ (برای بز)	
۴۵ ساعت بعد از خارج کردن وتوسیدر	۴۸-۵۲ ساعت بعد از خارج کردن وتوسیدر	تلقیح مصنوعی	

قرداد دادن و توسیدر	قرداد دادن و توسیدر	روز صفر	خارج از فصل آمیزش
خارج کردن و توسیدر و تزریق عضلانی PMSG ۴۰۰-۵۰۰ واحد بین المللی	خارج کردن و توسیدر و تزریق عضلانی PMSG ۴۰۰ واحد بین المللی	روز ۷-۱۲ (برای میش) روز ۱۷-۱۹ (برای بز)	
۴۰ ساعت بعد از خارج کردن و توسیدر	۵۰-۵۴ ساعت بعد از خارج کردن و توسیدر	تلقیح مصنوعی	
۴۵ ساعت بعد از خارج کردن و توسیدر	۶-۲۴ ساعت بعد از خارج کردن و توسیدر	قوچ انداری یا استفاده از بز نر	

#### موارد منع مصرف:

- برای گاوهایی که مهبل غیر طبیعی دارند مناسب نیست.
- در گوسفندهایی که به دلیل بیماری یا استرس غذایی دارای شرایط بدنی ضعیفی هستند استفاده نشود.

#### زمان پرهیز از مصرف:

دوره منع مصرف برای شیر و گوشت وجود ندارد اما قبل از ذبح دام سیدر را خارج نمایید.

#### شرایط نگهداری:

در درجه ۳۰-۲۵ درجه سانتیگراد و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

#### بسته بندی:

هر بسته حاوی یک سیدر به همراه غلاف مربوطه می باشد.



0098 21 7770 2066



0098 21 7788 3198



info@aburaihan.com  
marketing\_vet@aburaihan.com



www.aburaihan.com