



شرکت داروسازی ابوریحان
Aburaihan Pharmaceutical Co.
Health is Wealth
سلامتی سرمایه است

وتاسترول® (استرادیول بنزوات) Vetastrol® (Oestradiol Benzoate)

دسته دارویی: استروژن

شکل و ترکیب دارو: محلول تزریقی و هر میلی لیتر حاوی ۲ میلی گرم استرادیول بنزوات می باشد.
فارماکولوژی و مکانیسم عمل:

استرادیول بنزوات سبب شروع علائم فحلی در جنس ماده و نیز دارای اثر تحریکی رشد رحم، پستان‌ها، افزایش موکوس رحمی، انبساط سرویکس بوده و نیز سبب افزایش حساسیت رحم برای پاسخ به اکسی توسین می گردد. در مقادیر بالا از آزاد شدن (GnRH) و ترشح شیر جلوگیری کرده و در مقادیر پایین با افزایش خروج (FSH) رشد فولیکولی را تحریک می کند.

موارد مصرف:

گاو: در ضعف عمل لوتتال و ایجاد فحلی، مامی فیکاسیون، له شدن جنین، جفت ماندگی، متريت و پیومتريت.

اسب: فحلی خفیف و بدون تخمک گذاری، ایجاد زایمان.

گوسفند و بز: عدم فحلی و فحلی خفیف.

سگ: ایجاد سقط جنین و عفونت ادراری.

همچنین در سگ و گربه نر در آندوم مقعد افزایش میل جنسی، هیپرپلازی و تورم پروستات تجویز می گردد.

میزان و طریقه مصرف:

وتاسترول® را می توان از راه تزریق داخل عضلانی و یا زیر جلدی مصرف نمود.

گاو: در ضعف عمل لوتتال و ایجاد فحلی ۵ میلی گرم (ترجیحاً هم راه گنادوتروفین کوریونیک)، در مامی فیکاسیون، له شدگی جنین و جفت ملن دگی ۵-۱۰ میلی گرم و تکرار ۲-۳ بار در هفته و در متريت و پیومتريت ۲۰-۲۵ میلی گرم همزمان با اکسی توسین (۵۰ واحد) و تکرار درمان یک هفته بعد می باشد.

اسب: در فحلی خفیف و بدون تخمک گذاری ۵-۱۰ میلی گرم و در ایجاد زایمان ۵ میلی گرم و ۱۲-۲۴ ساعت قبل از تزریق اکسی توسین تجویز می گردد.

گوسفند و بز: در عدم فحلی ۱/۵ میلی گرم و تکرار درمان دو روز بعد و در فحلی خفیف ۱-۰/۵ میلی گرم تجویز گردد.

سگ: در ایجاد سقط ۲-۵ میلی گرم و یک تزریق ۲-۵ روز بعد از جفت گیری و همچنین در آندوم مقعد افزایش و میل جنسی، هیپرپلازی و تورم پروستات ۱-۲ میلی گرم و در صورت لزوم یک ماه بعد تکرار گردد.

گربه: در ایجاد سقط ۳-۵ روز بعد از جفت‌گیری ۰/۱۲۵-۰/۲۵ میلی گرم به روش داخل عضلانی تزریق شود.

موارد منع مصرف دارو:

در مقادیر زیاد و تکرار مصرف، ممکن است دارای اثرات غیر قابل پیش‌بینی گردد که عوارضی نظیر پرولاپس پس از زایش در گاو، سقط جنین در گاو، کاهش فعالیت تخمدان‌ها، هیپوپلازی و کیست‌های تخمدانی، در نرها پیشرفت صفات ثانویه جنسی مادینگی و در سگ کم خونی آپلاستیک را می‌توان ذکر نمود.

زمان پرهیز از مصرف:

زمان پرهیز از مصرف شیر و گوشت در دام‌های درمان شده با استروژن‌ها، بطور مشخصی در منابع علمی ذکر نشده است.

شرایط نگهداری دارو:

در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی‌گراد و دور از نور نگهداری شود. از انجماد دارو جلوگیری شود.

بسته بندی دارو:

هر جعبه حاوی یک عدد ویال ۱۰ میلی لیتری است.



0098 21 7770 2066



0098 21 7788 3198



info@aburaihan.com
marketing_vet@aburaihan.com



www.aburaihan.com